IQTIG Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen

Bundesauswertung

PM-NEO: Neonatologie

Auswertungsjahr 2026
Erfassungsjahr 2025

Stand: 14. August 2026, erstellt im Auftrag des Gemeinsamen Bundesausschusses

Impressum

Titel Neonatologie. Bundesauswertung. Auswertungsjahr 2026

Abgabe 14. August 2026

Auftraggeber

Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA)

Herausgeber

IQTIG — Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen
Katharina-Heinroth-Ufer 1 10787 Berlin
verfahrenssupport@iqtig.org | www.iqtig.org | (030) 58 58 26-340

Inhaltsverzeichnis

Einleitung 7

Datengrundlagen 9

Übersicht über die eingegangenen QS-Dokumentationsdaten 9

Ergebnisübersicht 10

Übersicht über die Ergebnisse der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen für das Erfassungsjahr 2025 11

Übersicht über die Ergebnisse der Auffälligkeitskriterien für das Erfassungsjahr 2025 16

Ergebnisse der Indikatoren/Kennzahlen und Gruppen 18

Gruppe: Sterblichkeit im Krankenhaus 18

51070: Sterblichkeit im Krankenhaus bei Risiko-Lebendgeborenen (rohe Rate) 18

222402: Sterblichkeit im Krankenhaus bei Risiko-Lebendgeborenen 21

51832: Sterblichkeit im Krankenhaus bei sehr kleinen Frühgeborenen (rohe Rate) 25

51837: Sterblichkeit im Krankenhaus bei sehr kleinen Frühgeborenen 28

Details zu den Ergebnissen 32

Gruppe: Intra- und periventrikuläre Hirnblutung (IVH Grad 3 oder PVH) 33

51076: Intra- und periventrikuläre Hirnblutung (IVH Grad 3 oder PVH) (rohe Rate) 33

50050: Intra- und periventrikuläre Hirnblutung (IVH Grad 3 oder PVH) 36

222200: Intra- und periventrikuläre Hirnblutung (IVH Grad 3 oder PVH) und Operation eines posthämorrhagischen Hydrozephalus 40

Details zu den Ergebnissen 43

Gruppe: Nekrotisierende Enterokolitis (NEK) und fokale intestinale Perforation (FIP) / singuläre intestinale Perforation (SIP) 44

51838: Nekrotisierende Enterokolitis (NEK) (rohe Rate) 44

51843: Nekrotisierende Enterokolitis (NEK) 47

222400: Fokale intestinale Perforation (FIP) / singuläre intestinale Perforation (SIP) (rohe Rate) 51

222401: Fokale intestinale Perforation (FIP) / singuläre intestinale Perforation (SIP) 54

222201: Nekrotisierende Enterokolitis (NEK) oder fokale intestinale Perforation (FIP) / singuläre intestinale Perforation (SIP) mit OP oder sonstiger invasiver Therapie einer NEK oder einer FIP/SIP 58

Details zu den Ergebnissen 62

Gruppe: Zystische periventrikuläre Leukomalazie (PVL) ... 64
51077: Zystische periventrikuläre Leukomalazie (PVL) (rohe Rate) ... 64
50051: Zystische periventrikuläre Leukomalazie (PVL) ... 67
Details zu den Ergebnissen ... 71
Gruppe: Bronchopulmonale Dysplasie (BPD) ... 72
51079: Bronchopulmonale Dysplasie (BPD) (rohe Rate) ... 72
50053: Bronchopulmonale Dysplasie (BPD) ... 75
Details zu den Ergebnissen ... 79
Gruppe: Höhergradige Frühgeborenenretinopathie (ROP) ... 80
51078: Höhergradige Frühgeborenenretinopathie (ROP) (rohe Rate) ... 80
50052: Höhergradige Frühgeborenenretinopathie (ROP) ... 83
Details zu den Ergebnissen ... 87
51901: Qualitätsindex der Frühgeborenenversorgung ... 88
Details zu den Ergebnissen ... 93
50060: Nosokomiale Infektion ... 95
Details zu den Ergebnissen ... 99
50062: Pneumothorax unter oder nach Beatmung ... 100
Details zu den Ergebnissen ... 104
52262: Zunahme des Kopfumfangs ... 105
50063: Durchführung eines Hörtests ... 108
Gruppe: Aufnahmetemperatur unter 36,0 °C ... 111
50069: Aufnahmetemperatur unter 36,0 °C bei sehr kleinen Frühgeborenen ... 111
50074: Aufnahmetemperatur unter 36,0 °C bei Risiko-Lebendgeborenen ... 115
Details zu den Ergebnissen ... 119
Detailergebnisse der Auffälligkeitskriterien ... 120
Auffälligkeitskriterien zur Plausibilität und Vollständigkeit ... 120
850206: Aufnahmetemperatur nicht angegeben ... 120
850207: Kopfumfang bei Entlassung ist geringer als bei Aufnahme ... 122
851813: Schwere oder letale angeborene Erkrankung ohne entsprechende ICD-Diagnose dokumentiert ... 124
851902: Weder eine moderate noch schwere BPD angegeben ... 126

852001: Erstes ROP-Screening außerhalb des empfohlenen Zeitraums ... 128
852300: Keine hypoxisch ischämische Enzephalopathie (HIE), aber eine Asphyxie mit therapeutischer Hypothermie angegeben ... 130
852301: Schwere oder letale angeborene Erkrankung angegeben ... 132
Auffälligkeitskriterien zur Vollzähligkeit ... 134
850199: Auffälligkeitskriterium zur Unterdokumentation ... 134
850200: Auffälligkeitskriterium zur Überdokumentation ... 136
850208: Auffälligkeitskriterium zum Minimaldatensatz (MDS) ... 138
Basisauswertung ... 140
Gesamtauswertung (Alle Kinder) ... 140
Basisdokumentation ... 140
Primär palliative Therapie (ab Geburt) ... 141
Angaben zur Geburt ... 141
Aufnahme ... 143
Diagnostik und Therapie ... 145
ROP-Screening nicht durchgeführt ... 147
Durchführung des ersten ROP-Screenings vor dem in der Leitlinie empfohlenen Zeitraum ... 148
Durchführung des ersten ROP-Screenings nach dem in der Leitlinie empfohlenen Zeitraum ... 149
Sauerstoffzufuhr, Beatmung und Bronchopulmonale Dysplasie ... 150
Sauerstoffzufuhr, Beatmung und Bronchopulmonale Dysplasie (Überlebende im Alter > 36 vollendete Wochen bzw. nach Hause entlassene Kinder) ... 152
Operation(en) und Prozeduren ... 157
Operation(en) und Prozeduren während des aktuellen stationären Aufenthaltes ... 158
Entlassung ... 160
VLBW-Auswertung (Lebendgeborene Kinder mit Geburtsgewicht < 1.500 g) ... 163
Primärer Verzicht auf kurative Therapie ... 164
Aufnahme ... 165
Diagnostik und Therapie ... 177
Dauer der Beatmungsart nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen) ... 182
ROP-Screening nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen) ... 193

Entlassung 196

Einleitung

Bei der Neonatologie handelt es sich um einen Zweig der angewandten Kinderheilkunde, der sich mit der Versorgung und Behandlung von Neu- bzw. Frühgeborenen beschäftigt. Hierbei ist die Sicherstellung einer guten Versorgungsqualität, insbesondere die Vermeidung von Erkrankungen sowie die Durchführung einer adäquaten Therapie, von großer Bedeutung.

Im Auswertungsmodul PM-NEO werden alle Neugeborenen erfasst, die innerhalb der ersten 7 Lebenstage stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden und eine Aufenthaltsdauer im Krankenhaus von über 12 Stunden haben oder die im Alter von 8 bis 120 Tagen von einem anderen Krankenhaus zuverlegt wurden und mindestens eines der folgenden Kriterien erfüllen:

- Aufnahmegewicht von weniger als 2.000 g
- stationärer Aufenthalt länger als 72 Stunden außerhalb der geburtshilflichen Abteilung
- Beatmung länger als eine Stunde
- schwerwiegende Erkrankung bei einem Aufnahmegewicht ab 2.000 g

Dokumentationspflichtig sind darüber hinaus Kinder, die im Kreißsaal oder in den ersten 7 Lebenstagen versterben oder die im Alter von 8 bis 120 Lebenstagen zuverlegt wurden und verstorben sind.

Unter Berücksichtigung dieser Kriterien werden pro Jahr aktuell über 100.000 Früh- oder Neugeborene erfasst. Bei ca. 10.000 Kindern von diesen handelt es sich um sehr kleine Frühgeborene mit einem Geburtsgewicht von weniger als 1.500 g oder mit einem Gestationsalter von weniger als 32 vollendeten Schwangerschaftswochen. Ein Großteil der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen im Auswertungsmodul PM-NEO bezieht sich auf diese Hochrisikogruppe. Neben der Erfassung der Sterblichkeit während des Krankenhausaufenthalts bei sehr kleinen Frühgeborenen (IDs 51832 und 51837) und Risiko-Lebendgeborenen (IDs 51070 und 222402) werden auch schwerwiegende Erkrankungen betrachtet, die Langzeitfolgen für diese Kinder nach sich ziehen können. Hierunter fallen höhergradige Hirnblutungen, die vermehrt mit späteren Behinderungen einhergehen (IDs 51076, 50050 und 222200 zur intra- und periventrikulären Hirnblutung (IVH Grad 3 oder PVH)), entzündliche Darmerkrankungen (IDs 51838, 51843, 222400, 222401 und 222201 zur nekrotisierenden Enterokolitis (NEK) und fokalen intestinalen Perforation (FIP) / singulären intestinalen Perforation (SIP)) sowie schwerwiegende Schädigungen der weißen Hirnsubstanz (IDs 51077 und 50051 zur zystischen periventrikulären Leukomalazie (PVL)), der Lunge (IDs 51079 und 50053 zur bronchopulmonalen Dysplasie (BPD)) oder der Netzhaut des Auges (IDs 51078 und 50052 zur höhergradigen Frühgeborenenretinopathie (ROP)). Zudem werden nosokomiale Infektionen – Infektionen, die im Verlauf eines Krankenhausaufenthalts erworben werden und zu den häufigsten Ursachen der Sterblichkeit dieser Kinder gehören – erfasst (ID 50060). Darüber hinaus wird erhoben, ob sich bei beatmeten Kindern eine Luftansammlung zwischen Lunge und Brustwand gebildet hat (ID 50062 zum Pneumothorax). Ein Qualitätsindex der Frühgeborenenversorgung (ID 51901), in dem verschiedene Kennzahlen der Ergebnisqualität für Frühgeborene verrechnet werden, wird ausgewiesen, da aufgrund der geringen Anzahl an Frühgeborenen zufällige statistische Schwankungen sehr ausgeprägt sind und oftmals keine verlässliche Ermittlung der Ergebnisqualität mittels eines einzelnen Indikators ermöglichen. Des Weiteren wird die Zunahme des Kopfumfangs während des stationären Aufenthalts

erfasst (ID 52262), da sich hierdurch zusätzliche Rückschlüsse auf die Kindesentwicklung und mögliche Qualitätsprobleme ziehen lassen. Neben diesen Qualitätsindikatoren und Kennzahlen der Ergebnisqualität werden auch Prozessindikatoren gemessen. Beispielsweise wird erhoben, ob die Körpertemperatur bei Aufnahme ins Krankenhaus unter 36,0 °C beträgt (IDs 50069 und 50074), da eine Unterkühlung schwerwiegende Komplikationen und Folgeerkrankungen hervorruft und sich somit auf die spätere Entwicklung der Kinder negativ auswirken kann. Zudem wird erfasst, ob ein Hörtest durchgeführt wurde (ID 50063), um frühestmöglich angeborene Hörstörungen diagnostizieren und eine entsprechende Therapie einleiten zu können.

Zu diesem Bericht steht unter https://iqtig.org/veroeffentlichungen/bundesauswertung/ eine Leseanleitung inkl. Glossar und unter https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/biometrische-grundlagen/biometrische-methodik-zur-risikoadjustierung/ die Erläuterungen zur Risikoadjustierung zum Download zur Verfügung.

Datengrundlagen

Die Auswertungen des vorliegenden Jahresberichts basieren auf folgenden Datenquellen:
• eingegangene QS-Dokumentationsdaten
• eingegangene standortbezogene Sollstatistik

Die nachfolgende Tabelle stellt die eingegangenen QS-Dokumentationsdaten (Spalte „geliefert“) sowie die Daten der Sollstatistik (Spalte „erwartet“) und die daraus resultierende Vollzähligkeit auf Bundesebene dar.

In den Zeilen der Tabelle sind Informationen zu den Datensätzen enthalten sowie zur Anzahl der Leistungserbringer.

Die Anzahl der Datensätze wird pro Vergleichsgruppe (Krankenhäuser) ausgegeben.

Die Anzahl der Leistungserbringer wird ebenfalls pro Vergleichsgruppe und zusätzlich auf IKNR/BSNR-Ebene und auf Standortebene ausgegeben. Bei der Standortebene wird zwischen dem Auswertungsstandort und dem entlassenden Standort unterschieden.

Auswertungsstandort bedeutet, dass zu diesem Standort Indikator- und Kennzahlberechnungen erfolgten; entlassender Standort bedeutet, dass dieser Standort QS-Fälle entlassen hat und damit sowohl für die QS-Dokumentation als auch für die Erstellung der Sollstatistik zuständig war. Daher liegt die Sollstatistik nur für die entlassenden Standorte vor und es kann auch nur für diese in der Spalte „erwartet“ eine Anzahl ausgegeben werden.

Für das Auswertungsmodul Neonatologie (PM-NEO) erfolgt die Auswertung der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen nach dem entlassenden Standort (= Auswertungsstandort).

Übersicht über die eingegangenen QS-Dokumentationsdaten

Erfassungsjahr 2025		**geliefert**	**erwartet**	**Vollzähligkeit in %**
Bund (gesamt)	Datensätze gesamt Basisdatensatz MDS	90.206 89.657 549	89.834	100,41
Anzahl Leistungserbringer	auf Standortebene (Auswertungsstandorte) Bund (gesamt)	421		
Anzahl Leistungserbringer	auf Standortebene (entlassender Standorte) Bund (gesamt)	442	461	95,88
Anzahl Leistungserbringer	auf IKNR-Ebene Bund (gesamt)	418	434	96,31

Ergebnisübersicht

In den nachfolgenden Tabellen werden sämtliche Qualitätsindikatoren und Kennzahlen sowie Auffälligkeitskriterien für eine Übersicht zusammengefasst.

Bitte beachten Sie dafür folgende Hinweise:

- Grundlage für die Jahresauswertung sind die Datensätze, die bis zur Jahreslieferfrist an die Bundesauswertungsstelle geliefert wurden. Nach Ende der Lieferfrist gelieferte Datensätze sind in den Auswertungen nicht enthalten.
- Bitte beachten Sie, dass Datensätze immer den Quartalen bzw. Jahren zugeordnet werden, in denen das Entlassungsdatum der Patientin oder des Patienten liegt (bei stationären Leistungen). Patientinnen oder Patienten, die in einem Quartal bzw. einem Jahr aufgenommen und behandelt wurden, aber erst im nachfolgenden Quartal oder Jahr entlassen wurden, sind sogenannte „Überlieger“.
- Perzentilbasierte Referenzbereiche werden für jedes Auswertungsjahr neu berechnet. Dies bedeutet, dass sich die Referenzwerte perzentilbasierter Referenzbereiche zwischen den jeweiligen Jahresauswertungen (und Zwischenberichten) unterscheiden können.

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Qualitätsindikatoren und Kennzahlen finden Sie im Kapitel „Ergebnisse der Indikatoren/Kennzahlen und Gruppen“. Weitere Informationen zum Auswertungsmodul PM-NEO finden Sie auf der Webseite des IQTIG unter https://iqtig.org/qs-verfahren/qs-pm/. Unter https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/ sind weiterführende Informationen zu den methodischen als auch biometrischen Grundlagen des IQTIG zu finden.

Übersicht über die Ergebnisse der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen für das Erfassungsjahr 2025

Indikatoren und Kennzahlen			Bund (gesamt)
ID	**Bezeichnung des Indikators oder der Kennzahl**	**Referenzbereich**	**Ergebnis**
Gruppe: Sterblichkeit im Krankenhaus			
51070	Sterblichkeit im Krankenhaus bei Risiko-Lebendgeborenen (rohe Rate)	Transparenzkennzahl	0,20 % O = 150 N = 76.070
222402	Sterblichkeit im Krankenhaus bei Risiko-Lebendgeborenen	≤ 2,74 (95. Perzentil)	0,81 O/E = 150 / 185,22 0,20 % O/N = 150 / 76.070
51832	Sterblichkeit im Krankenhaus bei sehr kleinen Frühgeborenen (rohe Rate)	Transparenzkennzahl	3,41 % O = 268 N = 7.861
51837	Sterblichkeit im Krankenhaus bei sehr kleinen Frühgeborenen	Transparenzkennzahl	0,97 O/E = 268 / 275,68 3,41 % O/N = 268 / 7.861

© IQTIG 2026

Indikatoren und Kennzahlen			Bund (gesamt)
ID	**Bezeichnung des Indikators oder der Kennzahl**	**Referenzbereich**	**Ergebnis**
Gruppe: Intra- und periventrikuläre Hirnblutung (IVH Grad 3 oder PVH)			
51076	Intra- und periventrikuläre Hirnblutung (IVH Grad 3 oder PVH) (rohe Rate)	Transparenzkennzahl	2,89 % O = 224 N = 7.747
50050	Intra- und periventrikuläre Hirnblutung (IVH Grad 3 oder PVH)	Transparenzkennzahl	0,89 O/E = 224 / 251,36 2,89 % O/N = 224 / 7.747
222200	Intra- und periventrikuläre Hirnblutung (IVH Grad 3 oder PVH) und Operation eines posthämorrhagischen Hydrozephalus	Transparenzkennzahl	0,64 % O = 53 N = 8.283

Indikatoren und Kennzahlen			Bund (gesamt)
ID	**Bezeichnung des Indikators oder der Kennzahl**	**Referenzbereich**	**Ergebnis**
Gruppe: Nekrotisierende Enterokolitis (NEK) und fokale intestinale Perforation (FIP) / singuläre intestinale Perforation (SIP)			
51838	Nekrotisierende Enterokolitis (NEK) (rohe Rate)	Transparenzkennzahl	2,06 % O = 174 N = 8.442
51843	Nekrotisierende Enterokolitis (NEK)	Transparenzkennzahl	1,03 O/E = 174 / 168,17 2,06 % O/N = 174 / 8.442
222400	Fokale intestinale Perforation (FIP) / singuläre intestinale Perforation (SIP) (rohe Rate)	Transparenzkennzahl	1,45 % O = 122 N = 8.442
222401	Fokale intestinale Perforation (FIP) / singuläre intestinale Perforation (SIP)	Transparenzkennzahl	1,13 O/E = 122 / 108,01 1,45 % O/N = 122 / 8.442
222201	Nekrotisierende Enterokolitis (NEK) oder fokale intestinale Perforation (FIP) / singuläre intestinale Perforation (SIP) mit OP oder sonstiger invasiver Therapie einer NEK oder einer FIP/SIP	Transparenzkennzahl	1,21 O/E = 200 / 165,05 2,37 % O/N = 200 / 8.442
Gruppe: Zystische periventrikuläre Leukomalazie (PVL)			
51077	Zystische periventrikuläre Leukomalazie (PVL) (rohe Rate)	Transparenzkennzahl	1,23 % O = 88 N = 7.179
50051	Zystische periventrikuläre Leukomalazie (PVL)	Transparenzkennzahl	0,78 O/E = 88 / 112,68 1,23 % O/N = 88 / 7.179

© IQTIG 2026

Indikatoren und Kennzahlen			Bund (gesamt)
ID	**Bezeichnung des Indikators oder der Kennzahl**	**Referenzbereich**	**Ergebnis**
Gruppe: Bronchopulmonale Dysplasie (BPD)			
51079	Bronchopulmonale Dysplasie (BPD) (rohe Rate)	Transparenzkennzahl	7,75 % O = 446 N = 5.752
50053	Bronchopulmonale Dysplasie (BPD)	Transparenzkennzahl	0,99 O/E = 446 / 450,36 7,75 % O/N = 446 / 5.752
Gruppe: Höhergradige Frühgeborenenretinopathie (ROP)			
51078	Höhergradige Frühgeborenenretinopathie (ROP) (rohe Rate)	Transparenzkennzahl	5,08 % O = 204 N = 4.017
50052	Höhergradige Frühgeborenenretinopathie (ROP)	Transparenzkennzahl	0,95 O/E = 204 / 213,81 5,08 % O/N = 204 / 4.017
51901	Qualitätsindex der Frühgeborenenversorgung	≤ 2,17 (95. Perzentil)	0,99 O/E = 1.087 / 1.093,63 12,88 % O/N = 1.087 / 8.442
50060	Nosokomiale Infektion	≤ 2,74 (95. Perzentil)	1,12 O/E = 882 / 786,42 1,20 % O/N = 882 / 73.275

© IQTIG 2026

Indikatoren und Kennzahlen			Bund (gesamt)
ID	**Bezeichnung des Indikators oder der Kennzahl**	**Referenzbereich**	**Ergebnis**
50062	Pneumothorax unter oder nach Beatmung	≤ 2,72 (95. Perzentil)	1,00 O/E = 812 / 814,52 2,41 % O/N = 812 / 33.749
52262	Zunahme des Kopfumfangs	Nicht definiert	10,30 % O = 1.117 N = 10.847
50063	Durchführung eines Hörtests	≥ 95,00 %	98,26 % O = 80.802 N = 82.234
Gruppe: Aufnahmetemperatur unter 36,0 °C			
50069	Aufnahmetemperatur unter 36,0 °C bei sehr kleinen Frühgeborenen	≤ 2,67 (95. Perzentil)	1,01 O/E = 373 / 369,20 4,26 % O/N = 373 / 8.759
50074	Aufnahmetemperatur unter 36,0 °C bei Risiko-Lebendgeborenen	≤ 2,48 (95. Perzentil)	1,09 O/E = 2.748 / 2.522,05 3,61 % O/N = 2.748 / 76.137

Übersicht über die Ergebnisse der Auffälligkeitskriterien für das Erfassungsjahr 2025

Auffälligkeitskriterien sind Kennzahlen, die auf Mängel in der Dokumentationsqualität hinweisen. Ähnlich wie mit Qualitätsindikatoren werden die Daten jedes Leistungserbringers anhand dieser Auffälligkeitskriterien auf Auffälligkeiten in den dokumentierten Daten geprüft.

Dabei können zwei Arten von Auffälligkeitskriterien unterschieden werden. Zum einen prüfen die Auffälligkeitskriterien zur Plausibilität und Vollständigkeit die inhaltliche Plausibilität der Angaben innerhalb der von einem Leistungserbringer gelieferten Datensätze. Mittels dieser Kriterien werden unwahrscheinliche oder widersprüchliche Werteverteilungen und Kombinationen von Werten einzelner Datenfelder geprüft (z. B. selten Komplikationen bei hoher Verweildauer). Zum anderen überprüfen Auffälligkeitskriterien zur Vollzähligkeit, inwiefern Fälle, die als dokumentationspflichtig eingeordnet wurden (Sollstatistik), auch tatsächlich übermittelt wurden.

Die Sollstatistik basiert auf dem entlassenden Standort, da dieser der abrechnende und der die QS-Dokumentation abschließende Standort ist. Die Auffälligkeitskriterien zur Vollzähligkeit werden daher auf Basis der entlassenden Standorte berechnet, im Gegensatz zu den Qualitätsindikatoren und Auffälligkeitskriterien zur Plausibilität und Vollständigkeit, die auf Basis der Auswertungsstandorte berechnet werden.

© IQTIG 2026

Auffälligkeitskriterien			Bund (gesamt)	
ID	**Bezeichnung des Auffälligkeitskriteriums**	**Referenzbereich**	**Ergebnis**	**rechnerisch auffällige Standorte**
Auffälligkeitskriterien zur Plausibilität und Vollständigkeit				
850206	Aufnahmetemperatur nicht angegeben	≤ 2,59 % (95. Perzentil)	0,85 % 738 / 86.331	4,59 % 19 / 414
850207	Kopfumfang bei Entlassung ist geringer als bei Aufnahme	≤ 3,08 % (95. Perzentil)	0,61 % 69 / 11.395	4,62 % 14 / 303
851813	Schwere oder letale angeborene Erkrankung ohne entsprechende ICD-Diagnose dokumentiert	= 0	13,15 % 383 / 2.912	19,26 % 47 / 244
851902	Weder eine moderate noch schwere BPD angegeben	≤ 80,00 %	57,21 % 603 / 1.054	14,91 % 24 / 161
852001	Erstes ROP-Screening außerhalb des empfohlenen Zeitraums	Nicht definiert	31,05 % 1.308 / 4.212	0,00 % 0 / 200
852300	Keine hypoxisch ischämische Enzephalopathie (HIE), aber eine Asphyxie mit therapeutischer Hypothermie angegeben	= 0	8,49 % 60 / 707	9,58 % 16 / 167
852301	Schwere oder letale angeborene Erkrankung angegeben	≤ 9,89 % (95. Perzentil)	3,30 % 2.949 / 89.429	4,31 % 18 / 418
Auffälligkeitskriterien zur Vollzähligkeit				
850199	Auffälligkeitskriterium zur Unterdokumentation	≥ 95,00 %	100,41 % 90.206 / 89.834	1,74 % 8 / 461
850200	Auffälligkeitskriterium zur Überdokumentation	≤ 110,00 %	100,41 % 90.206 / 89.834	1,08 % 5 / 461
850208	Auffälligkeitskriterium zum Minimaldatensatz (MDS)	≤ 5,00 %	0,61 % 549 / 89.834	1,74 % 8 / 461

© IQTIG 2026

Ergebnisse der Indikatoren/Kennzahlen und Gruppen

Gruppe: Sterblichkeit im Krankenhaus

Qualitätsziel	Niedrige Sterblichkeit

51070: Sterblichkeit im Krankenhaus bei Risiko-Lebendgeborenen (rohe Rate)


Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Grundgesamtheit	Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen, die zuvor in keiner anderen Kinderklinik (externer Kinderklinik oder externer Klinik als Rückverlegung) behandelt wurden, und mit einem Gestationsalter von mindestens 32+0 Wochen p. m. und einem Geburtsgewicht von mindestens 1.500 g
Zähler	Verstorbene Kinder
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2025 bis Quartal 4/2025

Detailergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis in %	95%-Vertrauensbereich in %
Bund	**2023**	167 / 76.629	0,22	0,19 - 0,25
	2024	179 / 76.662	0,23	0,20 - 0,27
	2025	150 / 76.070	0,20	0,17 - 0,23

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2025	412	0	0,00	100,00	0,00

222402: Sterblichkeit im Krankenhaus bei Risiko-Lebendgeborenen

Art des Wertes	Qualitätsindikator
Grundgesamtheit	Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen, die zuvor in keiner anderen Kinderklinik (externer Kinderklinik oder externer Klinik als Rückverlegung) behandelt wurden, und mit einem Gestationsalter von mindestens 32+0 Wochen p. m. und einem Geburtsgewicht von mindestens 1.500 g
Zähler	Verstorbene Kinder
O (observed)	Beobachtete Anzahl an Sterbefällen bei Risiko-Lebendgeborenen
E (expected)	Erwartete Anzahl an Sterbefällen bei Risiko-Lebendgeborenen, risikoadjustiert nach logistischem NEO-Score für ID 222402
Referenzbereich	≤ 2,74 (95. Perzentil)
Methode Auffälligkeit (Schwellenwert α)	Klassisch (-)
Methode der Risikoadjustierung	Logistische Regression
Verwendete Risikofaktoren	Asphyxie mit HIE Asphyxie ohne HIE Gestationsalter 32 abgeschlossene SSW Gestationsalter 33 abgeschlossene SSW
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2025 bis Quartal 4/2025


Detailergebnisse

Dimension		Anzahl in Grundgesamtheit (N)	Ergebnis O/E	Ergebnis*	95%-Vertrauensbereich
Bund	2023	-	- / -	-	-
	2024	76.662	179 / 179,00	1,00	0,86 - 1,16
	2025	76.070	150 / 185,22	0,81	0,69 - 0,95


* Verhältnis der beobachteten Anzahl zur erwarteten Anzahl. Werte kleiner eins bedeuten, dass die beobachtete Anzahl kleiner ist als erwartet und umgekehrt. Beispiel:
O / E = 1,2 Die beobachtete Anzahl ist 20 % größer als erwartet.
O / E = 0,9 Die beobachtete Anzahl ist 10 % kleiner als erwartet.

Ergebnisse im Zeitverlauf


Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre




Ergebnisse differenziert nach Anzahl der tatsächlichen Fallzahl je Leistungserbringer



Ergebnisse differenziert nach Anzahl der erwarteten Ereignisse je Leistungserbringer



Ergebnisse differenziert nach Risikoprofil je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum	Maximum	Median
2025	412	21	0,00	1.450,20	0,00

51832: Sterblichkeit im Krankenhaus bei sehr kleinen Frühgeborenen (rohe Rate)


Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Grundgesamtheit	Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m., die zuvor in keiner anderen Kinderklinik (externer Kinderklinik oder externer Klinik als Rückverlegung) behandelt wurden, und einem Geburtsgewicht unter 1.500 g oder einem Gestationsalter unter 32+0 Wochen p. m.
Zähler	Verstorbene Kinder
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2025 bis Quartal 4/2025

Detailergebnisse


Dimension		**Ergebnis O/N**	**Ergebnis in %**	**95%-Vertrauensbereich in %**
Bund	**2023**	265 / 8.478	3,13	2,78 - 3,52
	2024	286 / 8.197	3,49	3,11 - 3,91
	2025	268 / 7.861	3,41	3,03 - 3,83

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2025	260	0	0,00	100,00	0,00

51837: Sterblichkeit im Krankenhaus bei sehr kleinen Frühgeborenen

Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Grundgesamtheit	Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m., die zuvor in keiner anderen Kinderklinik (externer Kinderklinik oder externer Klinik als Rückverlegung) behandelt wurden, und einem Geburtsgewicht unter 1.500 g oder einem Gestationsalter unter 32+0 Wochen p. m.
Zähler	Verstorbene Kinder
O (observed)	Beobachtete Anzahl an Sterbefällen bei sehr kleinen Frühgeborenen
E (expected)	Erwartete Anzahl an Sterbefällen bei sehr kleinen Frühgeborenen, risikoadjustiert nach logistischem NEO-Score für ID 51837
Methode der Risikoadjustierung	Logistische Regression
Verwendete Risikofaktoren	Geschlecht = weiblich Gestationsalter 24 abgeschlossene SSW Gestationsalter 25 abgeschlossene SSW Gestationsalter 26 abgeschlossene SSW Gestationsalter 27 abgeschlossene SSW Gestationsalter 28 abgeschlossene SSW Gestationsalter 29 abgeschlossene SSW
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2025 bis Quartal 4/2025


Detailergebnisse

Dimension		Anzahl in Grundgesamtheit (N)	Ergebnis O/E	Ergebnis*	95%-Vertrauensbereich
Bund	**2023**	8.478	265 / 282,09	0,94	0,83 - 1,06
	2024	8.197	286 / 286,00	1,00	0,89 - 1,12
	2025	7.861	268 / 275,68	0,97	0,86 - 1,09


* Verhältnis der beobachteten Anzahl zur erwarteten Anzahl. Werte kleiner eins bedeuten, dass die beobachtete Anzahl kleiner ist als erwartet und umgekehrt. Beispiel:
O / E = 1,2 Die beobachtete Anzahl ist 20 % größer als erwartet.
O / E = 0,9 Die beobachtete Anzahl ist 10 % kleiner als erwartet.

Ergebnisse im Zeitverlauf


Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre




Ergebnisse differenziert nach Anzahl der tatsächlichen Fallzahl je Leistungserbringer



Ergebnisse differenziert nach Anzahl der erwarteten Ereignisse je Leistungserbringer



Ergebnisse differenziert nach Risikoprofil je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum	Maximum	Median
2025	260	0	0,00	30,70	0,00

Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
1.1	ID: 22_22000 Sterblichkeit bei Risiko-Lebendgeborenen	0,54 % 468/85.940

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
1.2	**ID: 51070** **Sterblichkeit im Krankenhaus bei Risiko-Lebendgeborenen (rohe Rate)**	0,20 % 150/76.070

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
1.3	Risikoadjustierung mittels logistischer Regression	
1.3.1	ID: O_222402 O/N (observed, beobachtet)	0,20 % 150/76.070
1.3.2	ID: E_222402 E/N (expected, erwartet)	0,24 % 185,22/76.070
1.3.3	**ID: 222402** **O/E**	0,81

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
1.4	**ID: 51832** **Sterblichkeit im Krankenhaus bei sehr kleinen Frühgeborenen (rohe Rate)**	3,41 % 268/7.861

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
1.5	Risikoadjustierung mittels logistischer Regression[1]	
1.5.1	ID: O_51837 O/N (observed, beobachtet)	3,41 % 268/7.861
1.5.2	ID: E_51837 E/N (expected, erwartet)	3,51 % 275,68/7.861
1.5.3	**ID: 51837** **O/E**	0,97

[1] nähere Details zur Risikoadjustierung (Risikofaktoren und Odds Ratios), siehe Leseanleitung auf der IQTIG-Webseite (https://iqtig.org/veroeffentlichungen/bundesauswertung/).

Gruppe: Intra- und periventrikuläre Hirnblutung (IVH Grad 3 oder PVH)

Qualitätsziel	Selten Hirnblutung (IVH Grad 3 oder PVH)

51076: Intra- und periventrikuläre Hirnblutung (IVH Grad 3 oder PVH) (rohe Rate)


Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Grundgesamtheit	Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m., die zuvor in keiner anderen Kinderklinik (externer Kinderklinik oder externer Klinik als Rückverlegung) behandelt wurden, und einem Geburtsgewicht unter 1.500 g oder einem Gestationsalter unter 32+0 Wochen p. m. und bei denen eine Sonographie durchgeführt wurde
Zähler	Kinder mit Hirnblutung (IVH Grad 3 oder PVH), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2025 bis Quartal 4/2025

Detailergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis in %	95%-Vertrauensbereich in %
Bund	**2023**	224 / 8.362	2,68	2,35 - 3,05
	2024	261 / 8.070	3,23	2,87 - 3,64
	2025	224 / 7.747	2,89	2,54 - 3,29

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2025	254	0	0,00	26,67	0,00

50050: Intra- und periventrikuläre Hirnblutung (IVH Grad 3 oder PVH)

Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Grundgesamtheit	Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m., die zuvor in keiner anderen Kinderklinik (externer Kinderklinik oder externer Klinik als Rückverlegung) behandelt wurden, und einem Geburtsgewicht unter 1.500 g oder einem Gestationsalter unter 32+0 Wochen p. m. und bei denen eine Sonographie durchgeführt wurde
Zähler	Kinder mit Hirnblutung (IVH Grad 3 oder PVH), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist
O (observed)	Beobachtete Anzahl an Kindern mit Hirnblutung (IVH Grad 3 oder PVH), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist
E (expected)	Erwartete Anzahl an Kindern mit Hirnblutung (IVH Grad 3 oder PVH), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist, risikoadjustiert nach logistischem NEO-Score für ID 50050
Methode der Risikoadjustierung	Logistische Regression
Verwendete Risikofaktoren	Gestationsalter 24 abgeschlossene SSW Gestationsalter 25 abgeschlossene SSW Gestationsalter 26 abgeschlossene SSW Gestationsalter 27 abgeschlossene SSW Gestationsalter 28 abgeschlossene SSW Gestationsalter 29 abgeschlossene SSW
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2025 bis Quartal 4/2025


Detailergebnisse

Dimension		Anzahl in Grundgesamtheit (N)	Ergebnis O/E	Ergebnis*	95%-Vertrauensbereich
Bund	**2023**	8.362	224 / 260,66	0,86	0,76 - 0,98
	2024	8.070	261 / 261,00	1,00	0,89 - 1,13
	2025	7.747	224 / 251,36	0,89	0,78 - 1,01


* Verhältnis der beobachteten Anzahl zur erwarteten Anzahl. Werte kleiner eins bedeuten, dass die beobachtete Anzahl kleiner ist als erwartet und umgekehrt. Beispiel:
O / E = 1,2 Die beobachtete Anzahl ist 20 % größer als erwartet.
O / E = 0,9 Die beobachtete Anzahl ist 10 % kleiner als erwartet.

Ergebnisse im Zeitverlauf


Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre




Ergebnisse differenziert nach Anzahl der tatsächlichen Fallzahl je Leistungserbringer



Ergebnisse differenziert nach Anzahl der erwarteten Ereignisse je Leistungserbringer



Ergebnisse differenziert nach Risikoprofil je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum	Maximum	Median
2025	254	0	0,00	21,26	0,00

222200: Intra- und periventrikuläre Hirnblutung (IVH Grad 3 oder PVH) und Operation eines posthämorrhagischen Hydrozephalus


Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Grundgesamtheit	Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m. und einem Geburtsgewicht unter 1.500 g oder einem Gestationsalter unter 32+0 Wochen p. m. und bei denen eine Sonographie durchgeführt wurde
Zähler	Kinder mit Hirnblutung (IVH Grad 3 oder PVH), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist, und Operation eines posthämorrhagischen Hydrozephalus
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2025 bis Quartal 4/2025

Detailergebnisse


Dimension		**Ergebnis O/N**	**Ergebnis in %**	**95%-Vertrauensbereich in %**
Bund	**2023**	44 / 9.048	0,49	0,36 - 0,65
	2024	42 / 8.682	0,48	0,36 - 0,65
	2025	53 / 8.283	0,64	0,49 - 0,84

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2025	274	0	0,00	12,50	0,00

Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
2.1	**ID: 51076** **Intra- und periventrikuläre Hirnblutung (IVH Grad 3 oder PVH) (rohe Rate)**	2,89 % 224/7.747

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
2.2	Risikoadjustierung mittels logistischer Regression[2]	
2.2.1	ID: O_50050 O/N (observed, beobachtet)	2,89 % 224/7.747
2.2.2	ID: E_50050 E/N (expected, erwartet)	3,24 % 251,36/7.747
2.2.3	**ID: 50050** **O/E**	0,89

[2] nähere Details zur Risikoadjustierung (Risikofaktoren und Odds Ratios), siehe Leseanleitung auf der IQTIG-Webseite (https://iqtig.org/veroeffentlichungen/bundesauswertung/).

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
2.3	**ID: 222200** **Intra- und periventrikuläre Hirnblutung (IVH Grad 3 oder PVH) und Operation eines posthämorrhagischen Hydrozephalus**	0,64 % 53/8.283

Gruppe: Nekrotisierende Enterokolitis (NEK) und fokale intestinale Perforation (FIP) / singuläre intestinale Perforation (SIP)

Qualitätsziel	Selten nekrotisierende Enterokolitis (NEK) und selten fokale intestinale Perforation (FIP) / singuläre intestinale Perforation (SIP)

51838: Nekrotisierende Enterokolitis (NEK) (rohe Rate)


Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Grundgesamtheit	Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m. und einem Geburtsgewicht unter 1.500 g oder einem Gestationsalter unter 32+0 Wochen p. m.
Zähler	Kinder mit nekrotisierender Enterokolitis (NEK), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2025 bis Quartal 4/2025

Detailergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis in %	95%-Vertrauensbereich in %
Bund	**2023**	170 / 9.221	1,84	1,59 - 2,14
	2024	173 / 8.847	1,96	1,69 - 2,27
	2025	174 / 8.442	2,06	1,78 - 2,39

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2025	282	0	0,00	20,00	0,00

51843: Nekrotisierende Enterokolitis (NEK)

Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Grundgesamtheit	Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m. und einem Geburtsgewicht unter 1.500 g oder einem Gestationsalter unter 32+0 Wochen p. m.
Zähler	Kinder mit nekrotisierender Enterokolitis (NEK), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist
O (observed)	Beobachtete Anzahl an Kindern mit nekrotisierender Enterokolitis (NEK), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist
E (expected)	Erwartete Anzahl an Kindern mit nekrotisierender Enterokolitis (NEK), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist, risikoadjustiert nach logistischem NEO-Score für ID 51843
Methode der Risikoadjustierung	Logistische Regression
Verwendete Risikofaktoren	Gestationsalter 24 abgeschlossene SSW Gestationsalter 25 abgeschlossene SSW Gestationsalter 26 abgeschlossene SSW Gestationsalter 27 abgeschlossene SSW Gestationsalter 28 abgeschlossene SSW Gestationsalter 29 abgeschlossene SSW Gestationsalter 30 abgeschlossene SSW
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2025 bis Quartal 4/2025


Detailergebnisse

Dimension		Anzahl in Grundgesamtheit (N)	Ergebnis O/E	Ergebnis*	95%-Vertrauensbereich
Bund	**2023**	9.221	170 / 175,84	0,97	0,83 - 1,12
	2024	8.847	173 / 173,00	1,00	0,86 - 1,16
	2025	8.442	174 / 168,17	1,03	0,89 - 1,20


* Verhältnis der beobachteten Anzahl zur erwarteten Anzahl. Werte kleiner eins bedeuten, dass die beobachtete Anzahl kleiner ist als erwartet und umgekehrt. Beispiel:
O / E = 1,2 Die beobachtete Anzahl ist 20 % größer als erwartet.
O / E = 0,9 Die beobachtete Anzahl ist 10 % kleiner als erwartet.

Ergebnisse im Zeitverlauf


Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre




Ergebnisse differenziert nach Anzahl der tatsächlichen Fallzahl je Leistungserbringer



Ergebnisse differenziert nach Anzahl der erwarteten Ereignisse je Leistungserbringer



Ergebnisse differenziert nach Risikoprofil je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum	Maximum	Median
2025	282	0	0,00	13,03	0,00

222400: Fokale intestinale Perforation (FIP) / singuläre intestinale Perforation (SIP) (rohe Rate)


Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Grundgesamtheit	Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m. und einem Geburtsgewicht unter 1.500 g oder einem Gestationsalter unter 32+0 Wochen p. m.
Zähler	Kinder mit fokaler intestinaler Perforation (FIP) / singulärer intestinaler Perforation (SIP), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2025 bis Quartal 4/2025

Detailergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis in %	95%-Vertrauensbereich in %
Bund	**2023**	- / -	-	-
	2024	110 / 8.847	1,24	1,03 - 1,50
	2025	122 / 8.442	1,45	1,21 - 1,72

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2025	282	0	0,00	9,09	0,00

222401: Fokale intestinale Perforation (FIP) / singuläre intestinale Perforation (SIP)

Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Grundgesamtheit	Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m. und einem Geburtsgewicht unter 1.500 g oder einem Gestationsalter unter 32+0 Wochen p. m
Zähler	Kinder mit fokaler intestinaler Perforation (FIP) / singulärer intestinaler Perforation (SIP), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist
O (observed)	Beobachtete Anzahl an Kindern mit fokaler intestinaler Perforation (FIP) / singulärer intestinaler Perforation (SIP), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist
E (expected)	Erwartete Anzahl an Kindern mit fokaler intestinaler Perforation (FIP) / singulärer intestinaler Perforation (SIP), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist, risikoadjustiert nach logistischem NEO-Score für ID 222401
Methode der Risikoadjustierung	Logistische Regression
Verwendete Risikofaktoren	Geschlecht = weiblich Gestationsalter 24 abgeschlossene SSW Gestationsalter 25 abgeschlossene SSW Gestationsalter 26 abgeschlossene SSW Gestationsalter 27 abgeschlossene SSW Gestationsalter 28 abgeschlossene SSW
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2025 bis Quartal 4/2025


Detailergebnisse

Dimension		Anzahl in Grundgesamtheit (N)	Ergebnis O/E	Ergebnis*	95%-Vertrauensbereich
Bund	**2023**	-	- / -	-	-
	2024	8.847	110 / 110,00	1,00	0,83 - 1,20
	2025	8.442	122 / 108,01	1,13	0,95 - 1,35


* Verhältnis der beobachteten Anzahl zur erwarteten Anzahl. Werte kleiner eins bedeuten, dass die beobachtete Anzahl kleiner ist als erwartet und umgekehrt. Beispiel:
O / E = 1,2 Die beobachtete Anzahl ist 20 % größer als erwartet.
O / E = 0,9 Die beobachtete Anzahl ist 10 % kleiner als erwartet.

Ergebnisse im Zeitverlauf


Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre




Ergebnisse differenziert nach Anzahl der tatsächlichen Fallzahl je Leistungserbringer



Ergebnisse differenziert nach Anzahl der erwarteten Ereignisse je Leistungserbringer



Ergebnisse differenziert nach Risikoprofil je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum	Maximum	Median
2025	282	0	0,00	5,74	0,00

222201: Nekrotisierende Enterokolitis (NEK) oder fokale intestinale Perforation (FIP) / singuläre intestinale Perforation (SIP) mit OP oder sonstiger invasiver Therapie einer NEK oder einer FIP/SIP

Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Grundgesamtheit	Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m. und einem Geburtsgewicht unter 1.500 g oder einem Gestationsalter unter 32+0 Wochen p. m.
Zähler	Kinder mit nekrotisierender Enterokolitis (NEK) oder mit fokaler intestinaler Perforation (FIP) / singulärer intestinaler Perforation (SIP), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist, und mit OP oder sonstiger invasiver Therapie einer NEK oder einer FIP/SIP
O (observed)	Beobachtete Anzahl an Kindern mit nekrotisierender Enterokolitis (NEK) oder mit fokaler intestinaler Perforation (FIP) / singulärer intestinaler Perforation (SIP), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist, und mit OP oder sonstiger invasiver Therapie einer NEK oder einer FIP/SIP
E (expected)	Erwartete Anzahl an Kindern mit nekrotisierender Enterokolitis (NEK) oder mit fokaler intestinaler Perforation (FIP) / singulärer intestinaler Perforation (SIP), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist, und mit OP oder sonstiger invasiver Therapie einer NEK oder einer FIP/SIP, risikoadjustiert nach logistischem NEO-Score für ID 222201
Methode der Risikoadjustierung	Logistische Regression
Verwendete Risikofaktoren	Gestationsalter 24 abgeschlossene SSW Gestationsalter 25 abgeschlossene SSW Gestationsalter 26 abgeschlossene SSW Gestationsalter 27 abgeschlossene SSW Gestationsalter 28 abgeschlossene SSW
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2025 bis Quartal 4/2025


Detailergebnisse

Dimension		Anzahl in Grundgesamtheit (N)	Ergebnis O/E	Ergebnis*	95%-Vertrauensbereich
Bund	**2023**	-	- / -	-	-
	2024	8.847	169 / 169,00	1,00	0,86 - 1,16
	2025	8.442	200 / 165,05	1,21	1,06 - 1,39


* Verhältnis der beobachteten Anzahl zur erwarteten Anzahl. Werte kleiner eins bedeuten, dass die beobachtete Anzahl kleiner ist als erwartet und umgekehrt. Beispiel:
O / E = 1,2 Die beobachtete Anzahl ist 20 % größer als erwartet.
O / E = 0,9 Die beobachtete Anzahl ist 10 % kleiner als erwartet.

Ergebnisse im Zeitverlauf


Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre




Ergebnisse differenziert nach Anzahl der tatsächlichen Fallzahl je Leistungserbringer



Ergebnisse differenziert nach Anzahl der erwarteten Ereignisse je Leistungserbringer



Ergebnisse differenziert nach Risikoprofil je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum	Maximum	Median
2025	282	0	0,00	5,64	0,00

Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
3.1	**ID: 51838** **Nekrotisierende Enterokolitis (NEK) (rohe Rate)**	2,06 % 174/8.442

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
3.2	Risikoadjustierung mittels logistischer Regression[3]	
3.2.1	ID: O_51843 O/N (observed, beobachtet)	2,06 % 174/8.442
3.2.2	ID: E_51843 E/N (expected, erwartet)	1,99 % 168,17/8.442
3.2.3	**ID: 51843** **O/E**	1,03

[3] nähere Details zur Risikoadjustierung (Risikofaktoren und Odds Ratios), siehe Leseanleitung auf der IQTIG-Webseite (https://iqtig.org/veroeffentlichungen/bundesauswertung/).

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
3.3	**ID: 222400** **Fokale intestinale Perforation (FIP) / singuläre intestinale Perforation (SIP) (rohe Rate)**	1,45 % 122/8.442

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
3.4	Risikoadjustierung mittels logistischer Regression[4]	
3.4.1	ID: O_222401 O/N (observed, beobachtet)	1,45 % 122/8.442
3.4.2	ID: E_222401 E/N (expected, erwartet)	1,28 % 108,01/8.442
3.4.3	**ID: 222401** **O/E**	1,13

[4] nähere Details zur Risikoadjustierung (Risikofaktoren und Odds Ratios), siehe Leseanleitung auf der IQTIG-Webseite (https://iqtig.org/veroeffentlichungen/bundesauswertung/).

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
3.5	Risikoadjustierung mittels logistischer Regression[5]	

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
3.5.1	ID: O_222201 O/N (observed, beobachtet)	2,37 % 200/8.442
3.5.2	ID: E_222201 E/N (expected, erwartet)	1,96 % 165,05/8.442
3.5.3	**ID: 222201** **O/E**	1,21

[5] nähere Details zur Risikoadjustierung (Risikofaktoren und Odds Ratios), siehe Leseanleitung auf der IQTIG-Webseite (https://iqtig.org/veroeffentlichungen/bundesauswertung/).

Gruppe: Zystische periventrikuläre Leukomalazie (PVL)

Qualitätsziel	Selten zystische periventrikuläre Leukomalazie (PVL)

51077: Zystische periventrikuläre Leukomalazie (PVL) (rohe Rate)


Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Grundgesamtheit	Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m., die zuvor in keiner anderen Kinderklinik (externer Kinderklinik oder externer Klinik als Rückverlegung) behandelt wurden, und einem Geburtsgewicht unter 1.500 g oder einem Gestationsalter unter 32+0 Wochen p. m., bei denen eine Sonographie durchgeführt wurde, und einem Lebensalter von mindestens 21 Tagen
Zähler	Kinder mit zystischer periventrikulärer Leukomalazie (PVL), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2025 bis Quartal 4/2025

Detailergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis in %	95%-Vertrauensbereich in %
Bund	**2023**	100 / 7.712	1,30	1,07 - 1,57
	2024	117 / 7.444	1,57	1,31 - 1,88
	2025	88 / 7.179	1,23	1,00 - 1,51

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2025	251	0	0,00	7,69	0,00

50051: Zystische periventrikuläre Leukomalazie (PVL)

Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Grundgesamtheit	Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m., die zuvor in keiner anderen Kinderklinik (externer Kinderklinik oder externer Klinik als Rückverlegung) behandelt wurden, und einem Geburtsgewicht unter 1.500 g oder einem Gestationsalter unter 32+0 Wochen p. m., bei denen eine Sonographie durchgeführt wurde, und einem Lebensalter von mindestens 21 Tagen
Zähler	Kinder mit zystischer periventrikulärer Leukomalazie (PVL), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist
O (observed)	Beobachtete Anzahl an Kindern mit zystischer periventrikulärer Leukomalazie (PVL), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist
E (expected)	Erwartete Anzahl an Kindern mit zystischer periventrikulärer Leukomalazie (PVL), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist, risikoadjustiert nach logistischem NEO-Score für ID 50051
Methode der Risikoadjustierung	Logistische Regression
Verwendete Risikofaktoren	Gestationsalter 24 abgeschlossene SSW Gestationsalter 25 abgeschlossene SSW Gestationsalter 26 abgeschlossene SSW Gestationsalter 27 abgeschlossene SSW Gestationsalter 28 abgeschlossene SSW Gestationsalter 29 abgeschlossene SSW Gestationsalter 30 abgeschlossene SSW
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2025 bis Quartal 4/2025


Detailergebnisse

Dimension		Anzahl in Grundgesamtheit (N)	Ergebnis O/E	Ergebnis*	95%-Vertrauensbereich
Bund	**2023**	7.712	100 / 119,74	0,84	0,69 - 1,01
	2024	7.444	117 / 117,00	1,00	0,84 - 1,20
	2025	7.179	88 / 112,68	0,78	0,63 - 0,96


* Verhältnis der beobachteten Anzahl zur erwarteten Anzahl. Werte kleiner eins bedeuten, dass die beobachtete Anzahl kleiner ist als erwartet und umgekehrt. Beispiel:
O / E = 1,2 Die beobachtete Anzahl ist 20 % größer als erwartet.
O / E = 0,9 Die beobachtete Anzahl ist 10 % kleiner als erwartet.

Ergebnisse im Zeitverlauf


Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre




Ergebnisse differenziert nach Anzahl der tatsächlichen Fallzahl je Leistungserbringer



Ergebnisse differenziert nach Anzahl der erwarteten Ereignisse je Leistungserbringer



Ergebnisse differenziert nach Risikoprofil je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum	Maximum	Median
2025	251	0	0,00	5,63	0,00

Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
4.2	**ID: 51077** **Zystische periventrikuläre Leukomalazie (PVL) (rohe Rate)**	1,23 % 88/7.179

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
4.1	Risikoadjustierung mittels logistischer Regression[6]	
4.1.1	ID: O_50051 O/N (observed, beobachtet)	1,23 % 88/7.179
4.1.2	ID: E_50051 E/N (expected, erwartet)	1,57 % 112,68/7.179
4.1.3	**ID: 50051** **O/E**	0,78

[6] nähere Details zur Risikoadjustierung (Risikofaktoren und Odds Ratios), siehe Leseanleitung auf der IQTIG-Webseite (https://iqtig.org/veroeffentlichungen/bundesauswertung/) .

Gruppe: Bronchopulmonale Dysplasie (BPD)

Qualitätsziel	Selten bronchopulmonale Dysplasie (BPD)

51079: Bronchopulmonale Dysplasie (BPD) (rohe Rate)


Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Grundgesamtheit	Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m., die zuvor in keiner anderen Kinderklinik (externer Kinderklinik oder externer Klinik als Rückverlegung) behandelt wurden, und einem Geburtsgewicht unter 1.500 g oder einem Gestationsalter unter 32+0 Wochen p. m. und die bei ihrer Entlassung mindestens 36+0 Wochen reif waren
Zähler	Kinder mit moderater oder schwerer bronchopulmonaler Dysplasie (BPD), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2025 bis Quartal 4/2025

Detailergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis in %	95%-Vertrauensbereich in %
Bund	**2023**	203 / 6.139	3,31	2,89 - 3,78
	2024	469 / 5.984	7,84	7,18 - 8,55
	2025	446 / 5.752	7,75	7,09 - 8,47

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2025	244	0	0,00	40,00	2,78

50053: Bronchopulmonale Dysplasie (BPD)

Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Grundgesamtheit	Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m., die zuvor in keiner anderen Kinderklinik (externer Kinderklinik oder externer Klinik als Rückverlegung) behandelt wurden, und einem Geburtsgewicht unter 1.500 g oder einem Gestationsalter unter 32+0 Wochen p. m. und die bei ihrer Entlassung mindestens 36+0 Wochen reif waren
Zähler	Kinder mit moderater oder schwerer bronchopulmonaler Dysplasie (BPD), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist
O (observed)	Beobachtete Anzahl an Kindern mit moderater oder schwerer bronchopulmonaler Dysplasie (BPD), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist
E (expected)	Erwartete Anzahl an Kindern mit moderater oder schwerer bronchopulmonaler Dysplasie (BPD), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist, risikoadjustiert nach logistischem NEO-Score für ID 50053
Methode der Risikoadjustierung	Logistische Regression
Verwendete Risikofaktoren	Geschlecht = weiblich Gestationsalter 24 abgeschlossene SSW Gestationsalter 25 abgeschlossene SSW Gestationsalter 26 abgeschlossene SSW Gestationsalter 27 abgeschlossene SSW Gestationsalter 28 abgeschlossene SSW Gestationsalter 29 abgeschlossene SSW
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2025 bis Quartal 4/2025


Detailergebnisse

Dimension		Anzahl in Grundgesamtheit (N)	Ergebnis O/E	Ergebnis*	95%-Vertrauensbereich
Bund	**2023**	6.139	203 / 461,49	0,44	0,38 - 0,50
	2024	5.984	469 / 469,00	1,00	0,92 - 1,09
	2025	5.752	446 / 450,36	0,99	0,91 - 1,08


* Verhältnis der beobachteten Anzahl zur erwarteten Anzahl. Werte kleiner eins bedeuten, dass die beobachtete Anzahl kleiner ist als erwartet und umgekehrt. Beispiel:
O / E = 1,2 Die beobachtete Anzahl ist 20 % größer als erwartet.
O / E = 0,9 Die beobachtete Anzahl ist 10 % kleiner als erwartet.

Ergebnisse im Zeitverlauf


Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre




Ergebnisse differenziert nach Anzahl der tatsächlichen Fallzahl je Leistungserbringer



Ergebnisse differenziert nach Anzahl der erwarteten Ereignisse je Leistungserbringer



Ergebnisse differenziert nach Risikoprofil je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum	Maximum	Median
2025	244	0	0,00	4,74	0,33

Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
5.1	**ID: 51079** **Bronchopulmonale Dysplasie (BPD) (rohe Rate)**	7,75 % 446/5.752

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
5.2	Risikoadjustierung mittels logistischer Regression[7]	
5.2.1	ID: O_50053 O/N (observed, beobachtet)	7,75 % 446/5.752
5.2.2	ID: E_50053 E/N (expected, erwartet)	7,83 % 450,36/5.752
5.2.3	**ID: 50053** **O/E**	0,99

[7] nähere Details zur Risikoadjustierung (Risikofaktoren und Odds Ratios), siehe Leseanleitung auf der IQTIG-Webseite (https://iqtig.org/veroeffentlichungen/bundesauswertung/) .

Gruppe: Höhergradige Frühgeborenenretinopathie (ROP)

Qualitätsziel	Selten höhergradige Frühgeborenenretinopathie (ROP)

51078: Höhergradige Frühgeborenenretinopathie (ROP) (rohe Rate)


Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Grundgesamtheit	Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m., die zuvor in keiner anderen Kinderklinik behandelt wurden (Erstaufnahme), oder zuverlegte Kinder, die bei Aufnahme nicht älter als 48 Stunden sind, und mit einem Gestationsalter unter 31+0 Wochen p. m., die bei Entlassung mindestens 36 Lebenstage aufweisen und bei denen ein ROP-Screening im aktuellen Aufenthalt durchgeführt wurde
Zähler	Kinder mit Frühgeborenenretinopathie (ROP) über 2
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2025 bis Quartal 4/2025

Detailergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis in %	95%-Vertrauensbereich in %
Bund	**2023**	199 / 4.290	4,64	4,05 - 5,31
	2024	226 / 4.184	5,40	4,76 - 6,13
	2025	204 / 4.017	5,08	4,44 - 5,80

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2025	198	0	0,00	66,67	0,00

50052: Höhergradige Frühgeborenenretinopathie (ROP)

Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Grundgesamtheit	Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m., die zuvor in keiner anderen Kinderklinik behandelt wurden (Erstaufnahme), oder zuverlegte Kinder, die bei Aufnahme nicht älter als 48 Stunden sind, und mit einem Gestationsalter unter 31+0 Wochen p. m., die bei Entlassung mindestens 36 Lebenstage aufweisen und bei denen ein ROP-Screening im aktuellen Aufenthalt durchgeführt wurde
Zähler	Kinder mit Frühgeborenenretinopathie (ROP) über 2
O (observed)	Beobachtete Anzahl an Kindern mit höhergradiger Frühgeborenenretinopathie (ROP)
E (expected)	Erwartete Anzahl an Kindern mit höhergradiger Frühgeborenenretinopathie (ROP), risikoadjustiert nach logistischem NEO-Score für ID 50052
Methode der Risikoadjustierung	Logistische Regression
Verwendete Risikofaktoren	Geschlecht = weiblich Gestationsalter 24 abgeschlossene SSW Gestationsalter 25 abgeschlossene SSW Gestationsalter 26 abgeschlossene SSW Gestationsalter 27 abgeschlossene SSW
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2025 bis Quartal 4/2025


Detailergebnisse

Dimension		Anzahl in Grundgesamtheit (N)	Ergebnis O/E	Ergebnis*	95%-Vertrauensbereich
Bund	**2023**	4.290	199 / 218,10	0,91	0,80 - 1,04
	2024	4.184	226 / 226,00	1,00	0,88 - 1,13
	2025	4.017	204 / 213,81	0,95	0,83 - 1,09


* Verhältnis der beobachteten Anzahl zur erwarteten Anzahl. Werte kleiner eins bedeuten, dass die beobachtete Anzahl kleiner ist als erwartet und umgekehrt. Beispiel:
O / E = 1,2 Die beobachtete Anzahl ist 20 % größer als erwartet.
O / E = 0,9 Die beobachtete Anzahl ist 10 % kleiner als erwartet.

Ergebnisse im Zeitverlauf


Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre




Ergebnisse differenziert nach Anzahl der tatsächlichen Fallzahl je Leistungserbringer



Ergebnisse differenziert nach Anzahl der erwarteten Ereignisse je Leistungserbringer



Ergebnisse differenziert nach Risikoprofil je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum	Maximum	Median
2025	198	0	0,00	7,35	0,00

Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
6.1	**ID: 51078** **Höhergradige Frühgeborenenretinopathie (ROP) (rohe Rate)**	5,08 % 204/4.017

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
6.2	Risikoadjustierung mittels logistischer Regression[8]	
6.2.1	ID: O_50052 O/N (observed, beobachtet)	5,08 % 204/4.017
6.2.2	ID: E_50052 E/N (expected, erwartet)	5,32 % 213,81/4.017
6.2.3	**ID: 50052** **O/E**	0,95

[8] nähere Details zur Risikoadjustierung (Risikofaktoren und Odds Ratios), siehe Leseanleitung auf der IQTIG-Webseite (https://iqtig.org/veroeffentlichungen/bundesauswertung/) .

51901: Qualitätsindex der Frühgeborenenversorgung

Qualitätsziel	Niedrige Sterblichkeit, selten Hirnblutung, selten nekrotisierende Enterokolitis oder selten fokale intestinale Perforation / singuläre intestinale Perforation, selten bronchopulmonale Dysplasie oder selten höhergradige Frühgeborenenretinopathie
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Grundgesamtheit	Ebene 1: Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m., die zuvor in keiner anderen Kinderklinik (externer Kinderklinik oder externer Klinik als Rückverlegung) behandelt wurden, und einem Geburtsgewicht unter 1.500 g oder einem Gestationsalter unter 32+0 Wochen p. m. ODER Ebene 2: Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m., die zuvor in keiner anderen Kinderklinik (externer Kinderklinik oder externer Klinik als Rückverlegung) behandelt wurden, und einem Geburtsgewicht unter 1.500 g oder einem Gestationsalter unter 32+0 Wochen p. m., bei denen eine Sonographie durchgeführt wurde, unter Ausschluss des Zählers der 1. Ebene ODER Ebene 3: Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m. und einem Geburtsgewicht unter 1.500 g oder einem Gestationsalter unter 32+0 Wochen p. m., unter Ausschluss des Zählers der 1. und 2. Ebene ODER Ebene 4: Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m., die zuvor in keiner anderen Kinderklinik (externer Kinderklinik oder externer Klinik als Rückverlegung) behandelt wurden, und einem Geburtsgewicht unter 1.500 g oder einem Gestationsalter unter 32+0 Wochen p. m., die bei ihrer Entlassung mindestens 36+0 Wochen reif waren, unter Ausschluss des Zählers der 1., 2. und 3. Ebene ODER Ebene 5: Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m., die zuvor in keiner anderen Klinik behandelt wurden (Erstaufnahme), oder zuverlegte Kinder, die bei Aufnahme nicht älter als 48 Stunden sind, und mit einem Gestationsalter unter 31+0 Wochen p. m., die bei Entlassung mindestens 36 Lebenstage aufweisen und bei denen ein ROP-Screening im aktuellen Aufenthalt durchgeführt wurde, unter Ausschluss des Zählers der 1., 2., 3. und 4. Ebene
Zähler	Ebene 1: Verstorbene Kinder ODER Ebene 2: Kinder mit Hirnblutung (IVH Grad 3 oder PVH), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist ODER Ebene 3: Kinder mit nekrotisierender Enterokolitis (NEK) oder mit fokaler intestinaler Perforation (FIP) / singulärer intestinaler Perforation (SIP), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist ODER Ebene 4: Kinder mit moderater oder schwerer bronchopulmonaler Dysplasie (BPD), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist ODER Ebene 5: Kinder mit Frühgeborenenretinopathie (ROP) über 2

O (observed)	Ebene 1: Beobachtete Anzahl an Sterbefällen bei sehr kleinen Frühgeborenen ODER Ebene 2: Beobachtete Anzahl an Kindern mit Hirnblutung (IVH Grad 3 oder PVH), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist ODER Ebene 3: Beobachtete Anzahl an Kindern mit nekrotisierender Enterokolitis (NEK) oder mit fokaler intestinaler Perforation (FIP) / singulärer intestinaler Perforation (SIP), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist ODER Ebene 4: Beobachtete Anzahl an Kindern mit moderater oder schwerer bronchopulmonaler Dysplasie (BPD), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist ODER Ebene 5: Beobachtete Anzahl an Kindern mit höhergradiger Frühgeborenenretinopathie (ROP)
E (expected)	Ebene 1: Erwartete Anzahl an Sterbefällen bei sehr kleinen Frühgeborenen, risikoadjustiert nach logistischem NEO-Score für die 1. Ebene des Qualitätsindex mit der ID 51901 UND Ebene 2: Erwartete Anzahl an Kindern mit Hirnblutungen (IVH Grad 3 oder PVH), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist, risikoadjustiert nach logistischem NEO-Score für die 2. Ebene des Qualitätsindex mit der ID 51901 UND Ebene 3: Erwartete Anzahl an Kindern mit nekrotisierender Enterokolitis (NEK) oder mit fokaler intestinaler Perforation (FIP) / singulärer intestinaler Perforation (SIP), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist, risikoadjustiert nach logistischem NEO-Score für die 3. Ebene des Qualitätsindex mit der ID 51901 UND Ebene 4: Erwartete Anzahl an Kindern mit moderater oder schwerer bronchopulmonaler Dysplasie (BPD), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist, risikoadjustiert nach logistischem NEO-Score für die 4. Ebene des Qualitätsindex mit der ID 51901 UND Ebene 5: Erwartete Anzahl an Kindern mit höhergradiger Frühgeborenenretinopathie (ROP), risikoadjustiert nach logistischem NEO-Score für die 5. Ebene des Qualitätsindex mit der ID 51901
Referenzbereich	≤ 2,17 (95. Perzentil)
Methode Auffälligkeit (Schwellenwert α)	Klassisch (-)
Methode der Risikoadjustierung	Logistische Regression
Verwendete Risikofaktoren	
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2025 bis Quartal 4/2025


Detailergebnisse

Dimension		Anzahl in Grundgesamtheit (N)	Ergebnis O/E	Ergebnis*	95%-Vertrauensbereich
Bund	**2023**	9.221	920 / 1.152,20	0,80	0,75 - 0,85
	2024	8.847	1.141 / 1.141,00	1,00	0,95 - 1,06
	2025	8.442	1.087 / 1.093,63	0,99	0,94 - 1,05


* Verhältnis der beobachteten Anzahl zur erwarteten Anzahl. Werte kleiner eins bedeuten, dass die beobachtete Anzahl kleiner ist als erwartet und umgekehrt. Beispiel:
O / E = 1,2 Die beobachtete Anzahl ist 20 % größer als erwartet.
O / E = 0,9 Die beobachtete Anzahl ist 10 % kleiner als erwartet.

Ergebnisse im Zeitverlauf


Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre




Ergebnisse differenziert nach Anzahl der tatsächlichen Fallzahl je Leistungserbringer



Ergebnisse differenziert nach Anzahl der erwarteten Ereignisse je Leistungserbringer



Ergebnisse differenziert nach Risikoprofil je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum	Maximum	Median
2025	282	19	0,00	30,72	0,60

Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
7.1	Risikoadjustierung mittels logistischer Regression[9]	
7.1.1	ID: O_51901 O/N (observed, beobachtet)	12,88 % 1.087/8.442
7.1.2	ID: E_51901 E/N (expected, erwartet)	12,95 % 1.093,63/8.442
7.1.3	**ID: 51901** **O/E**	0,99

[9] nähere Details zur Risikoadjustierung (Risikofaktoren und Odds Ratios), siehe Leseanleitung auf der IQTIG-Webseite (https://iqtig.org/veroeffentlichungen/bundesauswertung/) .

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
7.2	Ebene 1: Sterblichkeit im Krankenhaus bei sehr kleinen Frühgeborenen	
7.2.1	ID: O_51136_51901 O/N (observed, beobachtet)	3,41 % 268/7.861
7.2.2	ID: E_51136_51901 E/N (expected, erwartet)	3,50 % 275,52/7.861
7.2.3	ID: 51136_51901 O/E	0,97

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
7.3	Ebene 2: Intra- und periventrikuläre Hirnblutung (IVH Grad 3 oder PVH)	
7.3.1	ID: O_51141_51901 O/N (observed, beobachtet)	2,10 % 158/7.507
7.3.2	ID: E_51141_51901 E/N (expected, erwartet)	2,31 % 173,15/7.507
7.3.3	ID: 51141_51901 O/E	0,91

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
7.4	Ebene 3: Nekrotisierende Enterokolitis (NEK) oder fokale intestinale Perforation (FIP) / singuläre intestinale Perforation (SIP)	

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
7.4.1	ID: O_51146_51901 O/N (observed, beobachtet)	2,69 % 216/8.016
7.4.2	ID: E_51146_51901 E/N (expected, erwartet)	2,43 % 194,48/8.016
7.4.3	ID: 51146_51901 O/E	1,11

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
7.5	Ebene 4: Bronchopulmonale Dysplasie (BPD)	
7.5.1	ID: O_51156_51901 O/N (observed, beobachtet)	6,39 % 348/5.447
7.5.2	ID: E_51156_51901 E/N (expected, erwartet)	6,65 % 362,10/5.447
7.5.3	ID: 51156_51901 O/E	0,96

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
7.6	Ebene 5: Höhergradige Frühgeborenenretinopathie (ROP)	
7.6.1	ID: O_51161_51901 O/N (observed, beobachtet)	2,87 % 97/3.385
7.6.2	ID: E_51161_51901 E/N (expected, erwartet)	2,61 % 88,39/3.385
7.6.3	ID: 51161_51901 O/E	1,10

50060: Nosokomiale Infektion

Qualitätsziel	Selten nosokomiale Infektion
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Grundgesamtheit	Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m., die zuvor in keiner anderen Kinderklinik (externer Kinderklinik oder externer Klinik als Rückverlegung) behandelt und nicht von zu Hause aufgenommen wurden und die bei Entlassung über 3 Tage alt sind und am Tag der Geburt aufgenommen wurden
Zähler	Kinder mit Sepsis später als 3 Tage nach Geburt oder mit Pneumonie später als 3 Tage nach Geburt
O (observed)	Beobachtete Anzahl an Kindern mit nosokomialen Infektionen
E (expected)	Erwartete Anzahl an Kindern mit nosokomialen Infektionen, risikoadjustiert nach logistischem NEO-Score für ID 50060
Referenzbereich	≤ 2,74 (95. Perzentil)
Methode Auffälligkeit (Schwellenwert α)	Klassisch (-)
Methode der Risikoadjustierung	Logistische Regression
Verwendete Risikofaktoren	Geschlecht = weiblich Gestationsalter 24 abgeschlossene SSW Gestationsalter 25 abgeschlossene SSW Gestationsalter 26 abgeschlossene SSW Gestationsalter 27 abgeschlossene SSW Gestationsalter 28 abgeschlossene SSW Gestationsalter 29 abgeschlossene SSW Gestationsalter 30 abgeschlossene SSW Gestationsalter 31 abgeschlossene SSW Gestationsalter 32 abgeschlossene SSW Gestationsalter 33 abgeschlossene SSW Gestationsalter 34 abgeschlossene SSW
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2025 bis Quartal 4/2025


Detailergebnisse

Dimension		Anzahl in Grundgesamtheit (N)	Ergebnis O/E	Ergebnis*	95%-Vertrauensbereich
Bund	**2023**	74.185	903 / 812,14	1,11	1,04 - 1,19
	2024	73.969	819 / 819,00	1,00	0,93 - 1,07
	2025	73.275	882 / 786,42	1,12	1,05 - 1,20


* Verhältnis der beobachteten Anzahl zur erwarteten Anzahl. Werte kleiner eins bedeuten, dass die beobachtete Anzahl kleiner ist als erwartet und umgekehrt. Beispiel:
O / E = 1,2 Die beobachtete Anzahl ist 20 % größer als erwartet.
O / E = 0,9 Die beobachtete Anzahl ist 10 % kleiner als erwartet.

Ergebnisse im Zeitverlauf


Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre




Ergebnisse differenziert nach Anzahl der tatsächlichen Fallzahl je Leistungserbringer



Ergebnisse differenziert nach Anzahl der erwarteten Ereignisse je Leistungserbringer



Ergebnisse differenziert nach Risikoprofil je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum	Maximum	Median
2025	366	17	0,00	257,37	0,28

Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
8.1	ID: 22_22017 Kinder mit nosokomialen Infektionen (ohne zuverlegte Kinder)	1,20 % 882/73.275

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
8.2	Risikoadjustierung mittels logistischer Regression[10]	
8.2.1	ID: O_50060 O/N (observed, beobachtet)	1,20 % 882/73.275
8.2.2	ID: E_50060 E/N (expected, erwartet)	1,07 % 786,42/73.275
8.2.3	**ID: 50060** **O/E**	1,12

[10] nähere Details zur Risikoadjustierung (Risikofaktoren und Odds Ratios), siehe Leseanleitung auf der IQTIG-Webseite (https://iqtig.org/veroeffentlichungen/bundesauswertung/) .

50062: Pneumothorax unter oder nach Beatmung

Qualitätsziel	Selten Pneumothorax
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Grundgesamtheit	Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m., die zuvor in keiner anderen Kinderklinik (externer Kinderklinik oder externer Klinik als Rückverlegung) behandelt wurden, und mit nasaler/pharyngealer Atemhilfe und/oder intratrachealer Beatmung
Zähler	Kinder mit Pneumothorax nach oder unter irgendeiner Form von Atemhilfe/Beatmung, der während der Behandlung in der Neonatologie des eigenen Standortes oder bei Aufnahme aus dem Kreißsaal / der Geburtshilfe nach Erstversorgung durch ein Team des eigenen Standortes aufgetreten ist
O (observed)	Beobachtete Anzahl an Kindern mit Pneumothorax nach oder unter irgendeiner Form von Atemhilfe/Beatmung, der während der Behandlung in der Neonatologie des eigenen Standortes oder bei Aufnahme aus dem Kreißsaal / der Geburtshilfe nach Erstversorgung durch ein Team des eigenen Standortes aufgetreten ist
E (expected)	Erwartete Anzahl an Kindern mit Pneumothorax nach oder unter irgendeiner Form von Atemhilfe/Beatmung, der während der Behandlung in der Neonatologie des eigenen Standortes oder bei Aufnahme aus dem Kreißsaal / der Geburtshilfe nach Erstversorgung durch ein Team des eigenen Standortes aufgetreten ist, risikoadjustiert nach logistischem NEO-Score für ID 50062
Referenzbereich	≤ 2,72 (95. Perzentil)
Methode Auffälligkeit (Schwellenwert α)	Klassisch (-)
Methode der Risikoadjustierung	Logistische Regression
Verwendete Risikofaktoren	Geschlecht = weiblich Gestationsalter 24 abgeschlossene SSW Gestationsalter 25 abgeschlossene SSW Gestationsalter 26 abgeschlossene SSW Gestationsalter 27 abgeschlossene SSW Gestationsalter 28 abgeschlossene SSW Gestationsalter 29 abgeschlossene SSW Gestationsalter 30 abgeschlossene SSW
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2025 bis Quartal 4/2025


Detailergebnisse

Dimension		Anzahl in Grundgesamtheit (N)	Ergebnis O/E	Ergebnis*	95%-Vertrauensbereich
Bund	**2023**	32.304	759 / 790,43	0,96	0,90 - 1,03
	2024	33.443	815 / 815,00	1,00	0,93 - 1,07
	2025	33.749	812 / 814,52	1,00	0,93 - 1,07


* Verhältnis der beobachteten Anzahl zur erwarteten Anzahl. Werte kleiner eins bedeuten, dass die beobachtete Anzahl kleiner ist als erwartet und umgekehrt. Beispiel:
O / E = 1,2 Die beobachtete Anzahl ist 20 % größer als erwartet.
O / E = 0,9 Die beobachtete Anzahl ist 10 % kleiner als erwartet.

Ergebnisse im Zeitverlauf


Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre




Ergebnisse differenziert nach Anzahl der tatsächlichen Fallzahl je Leistungserbringer



Ergebnisse differenziert nach Anzahl der erwarteten Ereignisse je Leistungserbringer



Ergebnisse differenziert nach Risikoprofil je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum	Maximum	Median
2025	337	20	0,00	40,74	0,68

Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
9.1	ID: 22_22020 Pneumothorax bei Kindern unter oder nach Beatmung	2,41 % 812/33.749

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
9.2	Risikoadjustierung mittels logistischer Regression[11]	
9.2.1	ID: O_50062 O/N (observed, beobachtet)	2,41 % 812/33.749
9.2.2	ID: E_50062 E/N (expected, erwartet)	2,41 % 814,52/33.749
9.2.3	**ID: 50062** **O/E**	1,00
9.2.3.3	ID: 222000_50062 Keine Punktion oder Drainage des Pneumothorax	1,03 % 346/33.749
9.2.3.4	ID: 222001_50062 Behandlung des Pneumothorax mit Einmalpunktion	0,13 % 45/33.749
9.2.3.5	ID: 222002_50062 Behandlung des Pneumothorax mit mehreren Punktionen oder Pleuradrainage	1,25 % 421/33.749

[11] nähere Details zur Risikoadjustierung (Risikofaktoren und Odds Ratios), siehe Leseanleitung auf der IQTIG-Webseite (https://iqtig.org/veroeffentlichungen/bundesauswertung/).

52262: Zunahme des Kopfumfangs


Qualitätsziel	Möglichst angemessene Zunahme des Kopfumfangs während des stationären Aufenthaltes
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Grundgesamtheit	Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m. bis unter 37+0 Wochen p. m., die zuvor in keiner anderen Kinderklinik (externer Kinderklinik oder externer Klinik als Rückverlegung) behandelt wurden, sowie mit einer Verweildauer von mindestens 21 Tagen und einem Kopfumfang zwischen 20 cm und 50 cm unter Einschluss von Kindern, deren Kopfumfang zwischen Aufnahme und Entlassung zugenommen hat
Zähler	Kinder, bei denen die Differenz aus der relativen und der erwarteten relativen Zunahme des Kopfumfangs bei Entlassung (unter Verwendung einer linearen Regression) unterhalb des 10. Perzentils bei Anwendung des Z-Scores liegt
Referenzbereich	Nicht definiert
Methode Auffälligkeit (Schwellenwert α)	Klassisch (-)
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2025 bis Quartal 4/2025

Detailergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis in %	95%-Vertrauensbereich in %
Bund	**2023**	1.216 / 11.710	10,38	9,84 - 10,95
	2024	1.134 / 11.346	9,99	9,46 - 10,56
	2025	1.117 / 10.847	10,30	9,74 - 10,88

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2025	297	0	0,00	100,00	6,38

50063: Durchführung eines Hörtests


Qualitätsziel	Häufig Durchführung eines Hörtests
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Grundgesamtheit	Alle lebend nach Hause entlassenen Kinder ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von mindestens 22+0 Wochen p. m.
Zähler	Kinder mit durchgeführtem Hörtest
Referenzbereich	≥ 95,00 %
Methode Auffälligkeit (Schwellenwert α)	Klassisch (-)
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2025 bis Quartal 4/2025

Detailergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis in %	95%-Vertrauensbereich in %
Bund	**2023**	82.051 / 83.730	97,99	97,90 - 98,09
	2024	81.866 / 83.423	98,13	98,04 - 98,22
	2025	80.802 / 82.234	98,26	98,17 - 98,35

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2025	369	30	0,00	100,00	98,90

Gruppe: Aufnahmetemperatur unter 36,0 °C

Qualitätsziel	Möglichst wenige Kinder mit zu niedriger Aufnahmetemperatur

50069: Aufnahmetemperatur unter 36,0 °C bei sehr kleinen Frühgeborenen

Art des Wertes	Qualitätsindikator
Grundgesamtheit	Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von mindestens 22+0 Wochen p. m. und mit einer Angabe zur Aufnahmetemperatur und einem Geburtsgewicht unter 1.500 g oder einem Gestationsalter unter 32+0 Wochen p. m.
Zähler	Kinder mit einer Aufnahmetemperatur unter 36,0 °C
O (observed)	Beobachtete Anzahl an Kindern mit einer Aufnahmetemperatur unter 36,0 °C
E (expected)	Erwartete Anzahl an Kindern mit einer Aufnahmetemperatur unter 36,0 °C, risikoadjustiert nach logistischem NEO-Score für ID 50069
Referenzbereich	≤ 2,67 (95. Perzentil)
Methode Auffälligkeit (Schwellenwert α)	Klassisch (-)
Methode der Risikoadjustierung	Logistische Regression
Verwendete Risikofaktoren	Aufnahmegewicht unter 500 g Aufnahmegewicht 500-599 g Aufnahmegewicht 600-699 g Aufnahmegewicht 700-799 g Aufnahmegewicht 800-899 g Aufnahmegewicht 900-999 g Aufnahmegewicht 1.000-1.099 g Aufnahmegewicht 1.100-1.199 g Aufnahmegewicht 1.200-1.299 g Aufnahmegewicht 1.300-1.499 g
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2025 bis Quartal 4/2025


Detailergebnisse

Dimension		Anzahl in Grundgesamtheit (N)	Ergebnis O/E	Ergebnis*	95%-Vertrauensbereich
Bund	**2023**	9.535	402 / 387,64	1,04	0,94 - 1,14
	2024	9.183	384 / 384,00	1,00	0,91 - 1,10
	2025	8.759	373 / 369,20	1,01	0,91 - 1,12


* Verhältnis der beobachteten Anzahl zur erwarteten Anzahl. Werte kleiner eins bedeuten, dass die beobachtete Anzahl kleiner ist als erwartet und umgekehrt. Beispiel:
O / E = 1,2 Die beobachtete Anzahl ist 20 % größer als erwartet.
O / E = 0,9 Die beobachtete Anzahl ist 10 % kleiner als erwartet.

Ergebnisse im Zeitverlauf


Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre




Ergebnisse differenziert nach Anzahl der tatsächlichen Fallzahl je Leistungserbringer



Ergebnisse differenziert nach Anzahl der erwarteten Ereignisse je Leistungserbringer



Ergebnisse differenziert nach Risikoprofil je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum	Maximum	Median
2025	280	20	0,00	34,88	0,00

50074: Aufnahmetemperatur unter 36,0 °C bei Risiko-Lebendgeborenen

Art des Wertes	Qualitätsindikator
Grundgesamtheit	Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen und ohne perinatale Hypoxie/Ischämie (Asphyxie) mit therapeutischer Hypothermie und mit einer Angabe zur Aufnahmetemperatur und einem Geburtsgewicht von mindestens 1.500 g und einem Gestationsalter von mindestens 32+0 Wochen p. m.
Zähler	Kinder mit einer Aufnahmetemperatur unter 36,0 °C
O (observed)	Beobachtete Anzahl an Kindern mit einer Aufnahmetemperatur unter 36,0 °C
E (expected)	Erwartete Anzahl an Kindern mit einer Aufnahmetemperatur unter 36,0 °C, risikoadjustiert nach logistischem NEO-Score für ID 50074
Referenzbereich	≤ 2,48 (95. Perzentil)
Methode Auffälligkeit (Schwellenwert α)	Klassisch (-)
Methode der Risikoadjustierung	Logistische Regression
Verwendete Risikofaktoren	Aufnahmegewicht 1.500-2.099 g Aufnahmegewicht 2.100-2.399 g Aufnahmegewicht 2.400-2.699 g Aufnahmegewicht 2.700-2.999 g Aufnahmegewicht 3.000-3.299 g Aufnahmegewicht 3.300-3.599 g
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2025 bis Quartal 4/2025


Detailergebnisse

Dimension		Anzahl in Grundgesamtheit (N)	Ergebnis O/E	Ergebnis*	95%-Vertrauensbereich
Bund	**2023**	76.986	2.894 / 2.614,11	1,11	1,07 - 1,15
	2024	77.106	2.581 / 2.581,00	1,00	0,96 - 1,04
	2025	76.137	2.748 / 2.522,05	1,09	1,05 - 1,13


* Verhältnis der beobachteten Anzahl zur erwarteten Anzahl. Werte kleiner eins bedeuten, dass die beobachtete Anzahl kleiner ist als erwartet und umgekehrt. Beispiel:
O / E = 1,2 Die beobachtete Anzahl ist 20 % größer als erwartet.
O / E = 0,9 Die beobachtete Anzahl ist 10 % kleiner als erwartet.

Ergebnisse im Zeitverlauf


Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre




Ergebnisse differenziert nach Anzahl der tatsächlichen Fallzahl je Leistungserbringer



Ergebnisse differenziert nach Anzahl der erwarteten Ereignisse je Leistungserbringer



Ergebnisse differenziert nach Risikoprofil je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum	Maximum	Median
2025	397	18	0,00	24,14	0,92

Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
12.1	ID: 22_22022 Aufnahmetemperatur unter 36,0 °C bei sehr kleinen Frühgeborenen	4,26 % 373/8.759

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
12.2	Risikoadjustierung mittels logistischer Regression[12]	
12.2.1	ID: O_50069 O/N (observed, beobachtet)	4,26 % 373/8.759
12.2.2	ID: E_50069 E/N (expected, erwartet)	4,22 % 369,20/8.759
12.2.3	**ID: 50069** **O/E**	1,01

[12] nähere Details zur Risikoadjustierung (Risikofaktoren und Odds Ratios), siehe Leseanleitung auf der IQTIG-Webseite (https://iqtig.org/veroeffentlichungen/bundesauswertung/).

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
12.3	ID: 22_22024 Aufnahmetemperatur unter 36,0 °C bei Risiko-Lebendgeborenen	3,61 % 2.748/76.137

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
12.4	Risikoadjustierung mittels logistischer Regression[13]	
12.4.1	ID: O_50074 O/N (observed, beobachtet)	3,61 % 2.748/76.137
12.4.2	ID: E_50074 E/N (expected, erwartet)	3,31 % 2.522,05/76.137
12.4.3	**ID: 50074** **O/E**	1,09

[13] nähere Details zur Risikoadjustierung (Risikofaktoren und Odds Ratios), siehe Leseanleitung auf der IQTIG-Webseite (https://iqtig.org/veroeffentlichungen/bundesauswertung/) .


Detailergebnisse der Auffälligkeitskriterien

Auffälligkeitskriterien zur Plausibilität und Vollständigkeit

850206: Aufnahmetemperatur nicht angegeben

Art des Wertes	Datenvalidierung
Begründung für die Auswahl	**Relevanz** Fälle gehen ggf. nicht in den QI 50069 „Aufnahmetemperatur unter 36,0 °C bei sehr kleinen Frühgeborenen“ oder in den QI 50074 „Aufnahmetemperatur unter 36,0 °C bei Risiko-Lebendgeborenen“ ein. Die Körpertemperatur des Kindes sollte bei Aufnahme in das Krankenhaus gemessen werden. **Hypothese** Fehl-/Unterdokumentation der Aufnahmetemperatur (tatsächlich wurde in der Patientenakte die Aufnahmetemperatur dokumentiert)
Bezug zu Qualitätsindikatoren/ Kennzahlen	50069: Aufnahmetemperatur unter 36,0 °C bei sehr kleinen Frühgeborenen 50074: Aufnahmetemperatur unter 36,0 °C bei Risiko-Lebendgeborenen
Grundgesamtheit	Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von mindestens 22+0 Wochen p. m.
Zähler	Kinder, bei denen keine Aufnahmetemperatur angegeben wurde
Referenzbereich	≤ 2,59 % (95. Perzentil)
Mindestanzahl Nenner	10
Mindestanzahl Zähler	
Datenquellen	QS-Daten

Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2025	414	19	0,00	100,00	0,00


Detailergebnisse

Dimension / Erfassungsjahr 2025	Ergebnis O/N	Ergebnis in %	rechnerisch auffällig
Bund	738 / 86.331	0,85	4,59 % 19 / 414

850207: Kopfumfang bei Entlassung ist geringer als bei Aufnahme

Art des Wertes	Datenvalidierung
Begründung für die Auswahl	**Relevanz** Fälle gehen ggf. nicht in den Nenner des QI 52262 „Zunahme des Kopfumfangs“ ein. Der Kopfumfang sollte – mit Ausnahme von wenigen Ereignissen – während des stationären Aufenthaltes zunehmen. **Hypothese** Fehldokumentation des Kopfumfangs (tatsächlich wurde in der Patientenakte ein größerer Kopfumfang bei Entlassung als bei Aufnahme dokumentiert)
Bezug zu Qualitätsindikatoren/ Kennzahlen	52262: Zunahme des Kopfumfangs
Grundgesamtheit	Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m. bis unter 37+0 Wochen p. m., die zuvor in keiner anderen Kinderklinik (externer Kinderklinik oder externer Klinik als Rückverlegung) behandelt wurden, sowie mit einer Verweildauer von mindestens 21 Tagen und Angaben zum Kopfumfang bei Aufnahme sowie bei Entlassung
Zähler	Kinder, bei denen ein geringerer Kopfumfang bei Entlassung als bei Aufnahme angegeben wurde
Referenzbereich	≤ 3,08 % (95. Perzentil)
Mindestanzahl Nenner	5
Mindestanzahl Zähler	
Datenquellen	QS-Daten

Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2025	303	14	0,00	100,00	0,00


Detailergebnisse

Dimension / Erfassungsjahr 2025	Ergebnis O/N	Ergebnis in %	rechnerisch auffällig
Bund	69 / 11.395	0,61	4,62 % 14 / 303

851813: Schwere oder letale angeborene Erkrankung ohne entsprechende ICD-Diagnose dokumentiert

Art des Wertes	Datenvalidierung
Begründung für die Auswahl	**Relevanz** Fälle mit schwerer oder letaler angeborener Erkrankung werden aus dem Nenner aller Qualitätsindikatoren und Kennzahlen ausgeschlossen. Bei Angabe einer schweren oder letalen angeborenen Erkrankung sollte ein ICD-Kode aus der Liste mit schweren angeborenen und letalen angeborenen Erkrankungen vorliegen. **Hypothese** Fehldokumentation einer schweren oder letalen angeborenen Erkrankung (tatsächlich wurde in der Patientenakte ein ICD-Kode aus der Liste mit schweren angeborenen und letalen angeborenen Erkrankungen dokumentiert)
Bezug zu Qualitätsindikatoren/ Kennzahlen	Alle Qualitätsindikatoren und Kennzahlen
Grundgesamtheit	Alle Lebendgeborenen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m., bei denen angegeben wurde, dass eine schwere oder letale angeborene Erkrankung vorliegt
Zähler	Kinder, bei denen kein ICD-Kode aus der Liste mit schweren angeborenen und letalen angeborenen Erkrankungen angegeben wurde
Referenzbereich	= 0
Mindestanzahl Nenner	
Mindestanzahl Zähler	3
Datenquellen	QS-Daten

Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer




Detailergebnisse

Dimension / Erfassungsjahr 2025	Ergebnis O/N	Ergebnis in %	rechnerisch auffällig
Bund	383 / 2.912	13,15	19,26 % 47 / 244

851902: Weder eine moderate noch schwere BPD angegeben

Art des Wertes	Datenvalidierung
Begründung für die Auswahl	**Relevanz** Fälle gehen ggf. nicht in den Zähler der Kennzahl 51079 „Bronchopulmonale Dysplasie (BPD) (rohe Rate)“ oder in den Zähler der Kennzahl 50053 „Bronchopulmonale Dysplasie (BPD)“ oder in den Zähler des QI 51901 „Qualitätsindex der Frühgeborenenversorgung“ ein. Bei Erfüllung bestimmter Kriterien zum Vorliegen einer moderaten oder schweren BPD gemäß Nennerdefinition sollte eine moderate oder schwere BPD angegeben werden. **Hypothese** Fehl-/Unterdokumentation einer moderaten oder schweren BPD (tatsächlich wurde in der Patientenakte eine moderate oder schwere BPD dokumentiert)
Bezug zu Qualitätsindikatoren/ Kennzahlen	51079: Bronchopulmonale Dysplasie (BPD) (rohe Rate) 50053: Bronchopulmonale Dysplasie (BPD) 51901: Qualitätsindex der Frühgeborenenversorgung
Grundgesamtheit	Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen, die zuvor in keiner anderen Kinderklinik (externer Kinderklinik oder externer Klinik als Rückverlegung) behandelt wurden, mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m. und einem Gestationsalter unter 32+0 Wochen p. m., die im Alter von 36+0 Wochen Sauerstoff bekommen haben oder die im Alter von 36+0 Wochen beatmet wurden oder die vor 36+0 SSW nach Hause entlassen wurden und Sauerstoff bekommen haben oder beatmet wurden (jeweils zum Tag der Entlassung) oder mit einem Gestationsalter von mindestens 32+0 Wochen p. m. und einem Geburtsgewicht unter 1.500 g, die im Alter von 56 Lebenstagen Sauerstoff bekommen haben oder die im Alter von 56 Lebenstagen beatmet wurden oder die vor 56 Lebenstagen nach Hause entlassen wurden und Sauerstoff bekommen haben oder beatmet wurden (jeweils zum Tag der Entlassung)
Zähler	Kinder, bei denen weder eine moderate noch eine schwere BPD angegeben wurde
Referenzbereich	≤ 80,00 %
Mindestanzahl Nenner	
Mindestanzahl Zähler	2
Datenquellen	QS-Daten

Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2025	161	24	0,00	100,00	58,82


Detailergebnisse

Dimension / Erfassungsjahr 2025	Ergebnis O/N	Ergebnis in %	rechnerisch auffällig
Bund	603 / 1.054	57,21	14,91 % 24 / 161

852001: Erstes ROP-Screening außerhalb des empfohlenen Zeitraums

Art des Wertes	Datenvalidierung
Begründung für die Auswahl	**Relevanz** Das Datum des ersten ROP-Screenings sollte innerhalb des in der Leitlinie empfohlenen Zeitraums liegen. **Hypothese** Fehldokumentation des Datums des ersten ROP-Screenings (tatsächlich wurde in der Patientenakte das Datum des ersten ROP-Screenings im gemäß Leitlinie empfohlenen Zeitraum dokumentiert)
Grundgesamtheit	Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von 22+0 bis 30+6 Wochen (bei Geburt), die zuvor in keiner anderen Kinderklinik behandelt wurden (Erstaufnahme), oder zuverlegte Kinder, die bei Aufnahme nicht älter als 48 Stunden sind, und bei denen ein ROP-Screening im aktuellen Aufenthalt durchgeführt wurde
Zähler	Erstes ROP-Screening bei Kindern mit einem Gestationsalter von 22+0 bis 25+6 Wochen (bei Geburt) nicht zwischen einem postmenstruellen Alter von 31+0 bis 31+6 Wochen (nach Geburt) oder bei Kindern mit einem Gestationsalter von 26+0 bis 30+6 Wochen (bei Geburt) nicht in der 6. postnatalen Woche (entspricht Lebenstag 36 bis 42) durchgeführt
Referenzbereich	Nicht definiert
Mindestanzahl Nenner	
Mindestanzahl Zähler	
Datenquellen	QS-Daten

Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2025	200	0	0,00	100,00	33,33


Detailergebnisse

Dimension / Erfassungsjahr 2025	Ergebnis O/N	Ergebnis in %	rechnerisch auffällig
Bund	1.308 / 4.212	31,05	0,00 % 0 / 200

852300: Keine hypoxisch ischämische Enzephalopathie (HIE), aber eine Asphyxie mit therapeutischer Hypothermie angegeben

Art des Wertes	Datenvalidierung
Begründung für die Auswahl	**Relevanz** Es sollte eine HIE dokumentiert werden, wenn bei einem asphyktischen Kind eine therapeutische Hypothermie durchgeführt wurde. **Hypothese** Fehldokumentation einer HIE (tatsächlich wurde in der Patientenakte eine HIE dokumentiert)
Bezug zu Qualitätsindikatoren/ Kennzahlen	222402: Sterblichkeit im Krankenhaus bei Risiko-Lebendgeborenen
Grundgesamtheit	Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von mindestens 34+0 Wochen p. m. und mit Angabe einer Asphyxie mit therapeutischer Hypothermie
Zähler	Kinder, bei denen keine hypoxisch ischämische Enzephalopathie angegeben wurde
Referenzbereich	= 0
Mindestanzahl Nenner	
Mindestanzahl Zähler	2
Datenquellen	QS-Daten

Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer




Detailergebnisse

Dimension / Erfassungsjahr 2025	Ergebnis O/N	Ergebnis in %	rechnerisch auffällig
Bund	60 / 707	8,49	9,58 % 16 / 167

852301: Schwere oder letale angeborene Erkrankung angegeben

Art des Wertes	Datenvalidierung
Begründung für die Auswahl	**Relevanz** Fälle mit schwerer oder letaler angeborener Erkrankung werden aus dem Nenner aller Qualitätsindikatoren und Kennzahlen ausgeschlossen. Die Häufigkeit der Angabe einer schweren oder letalen angeborenen Erkrankung sollte daher in Bezug auf die übermittelten QS-Bögen plausibel sein. **Hypothese** Fehldokumentation einer schweren oder letalen angeborenen Erkrankung (tatsächlich wurde in der Patientenakte weder eine schwere noch eine letale angeborene Erkrankung dokumentiert)
Bezug zu Qualitätsindikatoren/ Kennzahlen	Alle Qualitätsindikatoren und Kennzahlen
Grundgesamtheit	Alle Lebendgeborenen mit einem Gestationsalter von mindestens 22+0 Wochen
Zähler	Kinder, bei denen angegeben wurde, dass eine schwere oder letale angeborene Erkrankung vorliegt
Referenzbereich	≤ 9,89 % (95. Perzentil)
Mindestanzahl Nenner	
Mindestanzahl Zähler	2
Datenquellen	QS-Daten

Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2025	418	18	0,00	100,00	0,64

Detailergebnisse


Dimension / Erfassungsjahr 2025	Ergebnis O/N	Ergebnis in %	rechnerisch auffällig
Bund	2.949 / 89.429	3,30	4,31 % 18 / 418

Auffälligkeitskriterien zur Vollzähligkeit

850199: Auffälligkeitskriterium zur Unterdokumentation

Art des Wertes	Datenvalidierung
Begründung für die Auswahl	**Relevanz** Dieses Auffälligkeitskriterium zielt darauf ab, eine Unterdokumentation abzubilden und somit mögliche daraus resultierende Auswirkungen auf Ebene der QI-Ergebnisse abschätzen zu können. Im Rahmen des Stellungnahmeverfahrens ist es möglich, den Ursachen für eine Unterdokumentation nachzugehen und Optimierungsmaßnahmen einzuleiten. **Hypothese** Organisatorische Probleme im Dokumentationsprozess oder das Weglassen komplizierter Fälle können zu niedrigen Dokumentationsraten in einzelnen Modulen führen. Dies kann die Aussagekraft der rechnerischen QI-Ergebnisse beeinflussen.
Bezug zu Qualitätsindikatoren/ Kennzahlen	Alle Qualitätsindikatoren und Kennzahlen
Grundgesamtheit	Anzahl durch den QS-Filter ausgelöster Fälle (methodische Sollstatistik: DATENSAETZE_MODUL)
Zähler	Anzahl der gelieferten vollständigen und plausiblen Datensätze einschließlich der Minimaldatensätze
Referenzbereich	≥ 95,00 %
Mindestanzahl Nenner	5 (Der Standort muss laut Sollstatistik mindestens 5 Fälle behandelt haben.)
Mindestanzahl Zähler	
Datenquellen	QS-Daten, Sollstatistik

Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2025	461	8	0,00	276,92	100,00


Detailergebnisse

Dimension / Erfassungsjahr 2025	Ergebnis O/N	Ergebnis in %	rechnerisch auffällig
Bund	90.206 / 89.834	100,41	1,74 % 8 / 461

850200: Auffälligkeitskriterium zur Überdokumentation

Art des Wertes	Datenvalidierung
Begründung für die Auswahl	**Relevanz** Dieses Auffälligkeitskriterium zielt darauf ab, eine Überdokumentation abzubilden und somit mögliche daraus resultierende Auswirkungen auf Ebene der QI-Ergebnisse abschätzen zu können. Im Rahmen des Stellungnahmeverfahrens ist es möglich, den Ursachen für eine Überdokumentation nachzugehen und Optimierungsmaßnahmen einzuleiten. **Hypothese** Organisatorische Probleme im Dokumentationsprozess einzelner Module können zu einer Überdokumentation führen. Dies kann die Aussagekraft der rechnerischen QI-Ergebnisse beeinflussen.
Bezug zu Qualitätsindikatoren/ Kennzahlen	Alle Qualitätsindikatoren und Kennzahlen
Grundgesamtheit	Anzahl durch den QS-Filter ausgelöster Fälle (methodische Sollstatistik: DATENSAETZE_MODUL)
Zähler	Anzahl der gelieferten vollständigen und plausiblen Datensätze einschließlich der Minimaldatensätze
Referenzbereich	≤ 110,00 %
Mindestanzahl Nenner	
Mindestanzahl Zähler	20
Datenquellen	QS-Daten, Sollstatistik

Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2025	461	5	0,00	276,92	100,00


Detailergebnisse

Dimension / Erfassungsjahr 2025	Ergebnis O/N	Ergebnis in %	rechnerisch auffällig
Bund	90.206 / 89.834	100,41	1,08 % 5 / 461

850208: Auffälligkeitskriterium zum Minimaldatensatz (MDS)

Art des Wertes	Datenvalidierung
Begründung für die Auswahl	**Relevanz** Minimaldatensätze können nicht für die Berechnung von Qualitätsindikatoren verwendet werden. Demnach sollten sie nur in begründeten Ausnahmefällen in der Dokumentation zur Anwendung kommen. **Hypothese** Fehlerhafte Verwendung von Minimaldatensätzen anstelle von regulären Datensätzen bei dokumentationspflichtigen Fällen.
Bezug zu Qualitätsindikatoren/ Kennzahlen	Alle Qualitätsindikatoren und Kennzahlen
Grundgesamtheit	Anzahl durch den QS-Filter ausgelöster Fälle (methodische Sollstatistik: DATENSAETZE_MODUL)
Zähler	Anzahl Minimaldatensätze
Referenzbereich	≤ 5,00 %
Mindestanzahl Nenner	5 (Der Standort muss laut Soll-Statistik im jeweiligen Leistungsbereich mindestens 5 Fälle behandelt haben.)
Mindestanzahl Zähler	
Datenquellen	QS-Daten, Sollstatistik

Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2025	461	8	0,00	117,39	0,00

Detailergebnisse

Dimension / Erfassungsjahr 2025	Ergebnis O/N	Ergebnis in %	rechnerisch auffällig
Bund	549 / 89.834	0,61	1,74 % 8 / 461

Basisauswertung

Gesamtauswertung (Alle Kinder)

Basisdokumentation

	Bund (gesamt)	
	n	%
Alle Kinder	**N = 89.657**	
Aufnahmequartal		
Aufnahme in den Vorjahren (Überliegerinnen und Überlieger)	3.016	3,36
1. Quartal	21.744	24,25
2. Quartal	22.266	24,83
3. Quartal	23.810	26,56
4. Quartal	18.821	20,99

	Bund (gesamt)	
	n	%
Alle Kinder	**N = 89.657**	
Lebendgeborene Kinder		
Lebendgeborene Kinder	89.652	99,99
davon: angeborene Erkrankungen		
(0) keine oder leichte angeborene Erkrankungen	86.658	96,66
(1) schwere oder letale angeborene Erkrankungen	2.994	3,34

Primär palliative Therapie (ab Geburt)

	Bund (gesamt)	
	n	%
Lebendgeborene Kinder	**N = 89.652**	
Primär palliative Therapie (ab Geburt)		
Primär palliative Therapie (ab Geburt)	469	0,52
davon: Verstorben im Kreißsaal		
(1) ja	407	86,78

	Bund (gesamt)	
	n	%
Lebendgeborene Kinder	**N = 89.652**	
Geschlecht		
(1) männlich	49.974	55,74
(2) weiblich	39.666	44,24
(3) divers	≤3	x
(8) unbestimmt	10	0,01

Angaben zur Geburt

	Bund (gesamt)	
	n	%
Lebendgeborene Kinder	**N = 89.652**	
Einlinge / Mehrlinge		
Einlinge	79.206	88,35
Zwillinge	9.994	11,15
≥ Drillinge	452	0,50

Angaben zur Geburt

	Bund (gesamt)	
	n	%
Lebendgeborene Kinder	**N = 89.652**	
Gestationsalter (vollendete Schwangerschaftswochen)		
< 24 SSW	773	0,86
24 - 25 SSW	1.140	1,27
26 - 28 SSW	2.382	2,66
29 - 31 SSW	4.072	4,54
32 - 36 SSW	26.544	29,61
≥ 37 SSW	54.741	61,06
Geburtsgewicht		
< 500 g	703	0,78
500 - 749 g	1.382	1,54
750 - 999 g	1.692	1,89
1.000 - 1.249 g	1.878	2,09
1.250 - 1.499 g	2.349	2,62
1.500 - 2.499 g	22.124	24,68
≥ 2.500 g	59.524	66,39

	Bund (gesamt)	
	n	%
Lebendgeborene Kinder mit endgültig (postnatal) bestimmtem Gestationsalter (vollendete Wochen) von 22 bis 43 SSW	**N = 89.427**	
Geburtsgewichtsperzentile[14]		
< 10. Perzentile	15.263	17,07
10. - 90. Perzentile	65.169	72,87
> 90. Perzentile	8.995	10,06

[14] Für die Perzentilberechnung wurden die geschlechtsspezifischen Perzentilwerte für das Geburtsgewicht von Jungen und Mädchen für vollendete Schwangerschaftswochen nach Voigt et al. (2014) verwendet. Dabei werden Fälle mit einem Gestationsalter von 22+0 bis 43+0 SSW berücksichtigt. Die Gesamtzahl kann aufgrund dessen von der ursprünglichen Gesamtzahl abweichen.

Grundlage zur Perzentilberechnung: Voigt, M; Rochow, N; Schneider, KTM; Hagenah, HP; Straube, S; Scholz, R; et al. (2014): Neue Perzentilwerte für die Körpermaße neugeborener Einlinge: Ergebnisse der deutschen Perinatalerhebung der Jahre 2007–2011 unter Beteiligung aller 16 Bundesländer. Z Geburtshilfe Neonatol 218(05): 210-217. DOI: 10.1055/s-0034-1385857.

Aufnahme

	Bund (gesamt)	
	n	%
Lebendgeborene Kinder	**N = 89.652**	
Geburtsort		
(1) in Geburtsklinik	88.391	98,59
davon: Transport zur Neonatologie		
(0) kein Transport zur Neonatologie	11.465	12,97
(1) Transport ohne Kraftfahrzeug (Inborn)	66.786	75,56
(2) Transport mit Kraftfahrzeug (Outborn)	10.140	11,47
(2) in außerklinischer Geburtseinrichtung	645	0,72
(3) zu Hause	465	0,52
(9) sonstiges (z. B. während Transport)	151	0,17

Aufnahme

	Bund (gesamt)	
	n	%
Lebendgeborene Kinder	**N = 89.652**	
Aufnahmestatus		
Inborn	72.805	81,21
Outborn	11.385	12,70
von zu Hause	2.394	2,67
Sekundäraufnahmen	2.607	2,91
Sonstiges	125	0,14

	Bund (gesamt)	
	n	%
Lebendgeborene Kinder mit endgültig (postnatal) bestimmtem Gestationsalter (vollendete Wochen) ≥ 22 SSW, die nicht im Kreißsaal verstorben sind oder bei denen dazu keine Angabe gemacht wurde	**N = 89.202**	
Aufnahmetemperatur		
< 32,0 °C	25	0,03
32,0 - 33,9 °C	186	0,21
34,0 - 35,9 °C	3.370	3,78
36,0 - 37,5 °C	76.487	85,75
> 37,5 °C	8.226	9,22

Diagnostik und Therapie

	Bund (gesamt)	
	n	%
Lebendgeborene Kinder mit endgültig (postnatal) bestimmtem Gestationsalter (vollendete Wochen) ≥ 22 SSW, die nicht im Kreißsaal verstorben sind oder bei denen dazu keine Angabe gemacht wurde	**N = 89.202**	
Schädelsonogramm		
(0) nein	19.405	21,75
(1) ja	69.797	78,25
davon: Intraventrikuläre (IVH) oder periventrikuläre (PVH) Hämorrhagie		
(0) nein	67.661	96,94
(1) IVH Grad I	1.136	1,63
(2) IVH Grad II	356	0,51
(3) IVH Grad III	344	0,49
(4) periventrikuläre Hämorrhagie (PVH)	300	0,43
davon: Status bei Aufnahme bei (1), (2), (3) oder (4)		
(1) IVH / PVH ist während des stationären Aufenthaltes erstmalig aufgetreten	1.409	65,96
(2) IVH / PVH lag bereits bei Aufnahme vor	727	34,04
davon: Zystische periventrikuläre Leukomalazie (PVL)		
(0) nein	69.587	99,70
(1) ja	210	0,30
davon: Status bei Aufnahme		
(1) PVL ist während des stationären Aufenthaltes erstmalig aufgetreten	142	67,62
(2) PVL lag bereits bei Aufnahme vor	68	32,38

	Bund (gesamt)	
	n	**%**
Lebendgeborene Kinder mit endgültig (postnatal) bestimmtem Gestationsalter (vollendete Wochen) ≥ 22 SSW, die nicht im Kreißsaal verstorben sind oder bei denen dazu keine Angabe gemacht wurde	**N = 89.202**	
ROP-Screening durchgeführt/vorhanden		
(0) nein	83.009	93,06
(1) ja, im aktuellen Aufenthalt	5.972	6,69
(2) ja, in einem vorherigen Aufenthalt	221	0,25
davon: Frühgeborenen-Retinopathie (ROP)[15]		
(0) nein	4.564	73,70
(1) Stadium 1 (Demarkationslinie)	725	11,71
(2) Stadium 2 (Prominente Leiste)	528	8,53
(3) Stadium 3 (Prominente Leiste und extraretinale fibrovaskuläre Proliferationen)	373	6,02
(4) Stadium 4 (Partielle Amotio retinae)	≤3	x
(5) Stadium 5 (Totale Amotio retinae)	≤3	x
davon: ROP-Status bei Aufnahme bei (1), (2), (3), (4) oder (5)		
(1) ROP ist während des stationären Aufenthaltes erstmalig aufgetreten	1.445	88,70
(2) ROP lag bereits bei Aufnahme vor	184	11,30

[15] maximales Stadium während des stationären Aufenthaltes

ROP-Screening nicht durchgeführt

	Bund (gesamt)	
	n	%
Lebendgeborene Kinder ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von 22+0 bis 30+6 Wochen (bei Geburt), die bei einem Gestationsalter von 22+0 bis 25+6 Wochen (bei Geburt) bei Entlassung ein postmenstruelles Alter von mindestens 31+6 Wochen (nach Geburt) aufweisen oder die bei einem Gestationsalter von 26+0 bis 30+6 Wochen (bei Geburt) bei Entlassung mindestens 42 Lebenstage aufweisen, bei denen das ROP-Screening nicht in einem vorherigen Aufenthalt durchgeführt wurde	**N = 4.525**	
ROP-Screening nicht durchgeführt; nach Gestationsalter (in vollendeten Schwangerschaftswochen)		
22 SSW	≤3	x
23 SSW	11	0,24
24 SSW	17	0,38
25 SSW	14	0,31
26 SSW	32	0,71
27 SSW	18	0,40
28 SSW	55	1,22
29 SSW	48	1,06
30 SSW	90	1,99
Gesamt	287	6,34

Durchführung des ersten ROP-Screenings vor dem in der Leitlinie empfohlenen Zeitraum

	Bund (gesamt)	
	n	%
Lebendgeborene Kinder ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von 22+0 bis 30+6 Wochen (bei Geburt), die zuvor in keiner anderen Kinderklinik behandelt wurden (Erstaufnahme) oder zuverlegte Kinder, die bei Aufnahme nicht älter als 48 Stunden sind, bei denen ein ROP-Screening im aktuellen Aufenthalt durchgeführt wurde	**N = 4.212**	
Erstes ROP-Screening bei Kindern mit einem Gestationsalter von 22+0 bis 25+6 Wochen (bei Geburt) vor einem postmenstruellen Alter von 31+0 Wochen (nach Geburt) oder bei Kindern mit einem Gestationsalter von 26+0 bis 30+6 Wochen (bei Geburt) vor der 6. postnatalen Woche (entspricht Lebenstag 36) durchgeführt; nach Gestationsalter (in vollendeten Schwangerschaftswochen)[16]		
22 SSW	5	0,12
23 SSW	29	0,69
24 SSW	40	0,95
25 SSW	51	1,21
26 SSW	30	0,71
27 SSW	50	1,19
28 SSW	70	1,66
29 SSW	87	2,07
30 SSW	151	3,58
Gesamt	513	12,18

[16] Grundsätzlich sollte die erste augenärztliche Untersuchung in der 6. postnatalen Woche (Lebenstag 36 bis 42) erfolgen, aber nicht vor einem postmenstruellen Alter von 31+0 Wochen. Aktuelle Daten sprechen dafür, dass auch bei extrem unreifen Frühgeborenen die erste Untersuchung mit 31+0 postmenstruellen Wochen ausreichend früh erfolgt (Maier et al. 2020).

Referenz:
Maier, RF; Hummler, H; Kellner, U; Krohne, TU; Lawrenz, B; Lorenz, B; et al. (2020): AWMF-Registernummer 024-010. S2k-Leitlinie: Augenärztliche Screening-Untersuchung bei Frühgeborenen [Langfassung]. Versions-Nummer: 3.0. [Stand: 24.03.2020], Erstveröffentlichung: 06/1998, Überarbeitung von: 03/2020. [Berlin]: GNPI [Gesellschaft für Neonatologie und pädiatrische Intensivmedizin]. URL: https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/024-010l_S2k_Augenaerztliche_Screening-Untersuchung_Fr%C3%BChgeborene_2020-07.pdf (abgerufen am: 06.04.2022).

Durchführung des ersten ROP-Screenings nach dem in der Leitlinie empfohlenen Zeitraum

	Bund (gesamt)	
	n	%
Lebendgeborene Kinder ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von 22+0 bis 30+6 Wochen (bei Geburt), die zuvor in keiner anderen Kinderklinik behandelt wurden (Erstaufnahme) oder zuverlegte Kinder, die bei Aufnahme nicht älter als 48 Stunden sind, bei denen ein ROP-Screening im aktuellen Aufenthalt durchgeführt wurde	**N = 4.212**	
Erstes ROP-Screening bei Kindern mit einem Gestationsalter von 22+0 bis 25+6 Wochen (bei Geburt) nach einem postmenstruellen Alter von 31+0 Wochen (nach Geburt) oder bei Kindern mit einem Gestationsalter von 26+0 bis 30+6 Wochen (bei Geburt) nach der 6. postnatalen Woche (entspricht Lebenstag 42) durchgeführt; nach Gestationsalter (in vollendeten Schwangerschaftswochen)[17]		
22 SSW	6	0,14
23 SSW	38	0,90
24 SSW	81	1,92
25 SSW	100	2,37
26 SSW	113	2,68
27 SSW	105	2,49
28 SSW	128	3,04
29 SSW	126	2,99
30 SSW	98	2,33
Gesamt	795	18,87

[17] Grundsätzlich sollte die erste augenärztliche Untersuchung in der 6. postnatalen Woche (Lebenstag 36 bis 42) erfolgen, aber nicht vor einem postmenstruellen Alter von 31+0 Wochen. Aktuelle Daten sprechen dafür, dass auch bei extrem unreifen Frühgeborenen die erste Untersuchung mit 31+0 postmenstruellen Wochen ausreichend früh erfolgt (Maier et al. 2020).

Referenz:
Maier, RF; Hummler, H; Kellner, U; Krohne, TU; Lawrenz, B; Lorenz, B; et al. (2020): AWMF-Registernummer 024-010. S2k-Leitlinie: Augenärztliche Screening-Untersuchung bei Frühgeborenen [Langfassung]. Versions-Nummer: 3.0. [Stand: 24.03.2020], Erstveröffentlichung: 06/1998, Überarbeitung von: 03/2020. [Berlin]: GNPI [Gesellschaft für Neonatologie und pädiatrische Intensivmedizin]. URL: https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/024-010l_S2k_Augenaerztliche_Screening-Untersuchung_Fr%C3%BChgeborene_2020-07.pdf (abgerufen am: 06.04.2022).

Sauerstoffzufuhr, Beatmung und Bronchopulmonale Dysplasie

	Bund (gesamt)	
	n	%
Lebendgeborene Kinder mit endgültig (postnatal) bestimmtem Gestationsalter (vollendete Wochen) ≥ 22 SSW, die nicht im Kreißsaal verstorben sind oder bei denen dazu keine Angabe gemacht wurde	**N = 89.202**	
Sauerstoffzufuhr jeglicher Art nach Aufnahme (von mehr als 30 Minuten)		
(0) nein	65.251	73,15
(1) ja	23.951	26,85
davon: Dauer der Sauerstoffzufuhr		
0 - 9 Tage	19.822	82,76
10 - 27 Tage	1.757	7,34
> 27 Tage	2.372	9,90
Beatmung (von mehr als 30 Minuten)		
(0) keine Atemhilfe	51.943	58,23
(1) nur nasale / pharyngeale Beatmung	30.442	34,13
(2) nur intratracheale Beatmung	929	1,04
(3) nasale / pharyngeale und intratracheale Beatmung	5.888	6,60
davon: Beatmungsdauer bei (1), (2) oder (3)		
0 - 7 Tage	30.328	81,40
8 - 14 Tage	2.544	6,83
15 - 21 Tage	1.037	2,78
22 - 28 Tage	797	2,14
> 28 Tage	2.553	6,85

Sauerstoffzufuhr, Beatmung und Bronchopulmonale Dysplasie

	Bund (gesamt)	
	n	%
Lebendgeborene Kinder mit endgültig (postnatal) bestimmtem Gestationsalter (vollendete Wochen) ≥ 22 SSW, die nicht im Kreißsaal verstorben sind oder bei denen dazu keine Angabe gemacht wurde	**N = 89.202**	
Bronchopulmonale Dysplasie (BPD)[18]		
(0) weder moderate noch schwere BPD	88.355	99,05
(2) moderate BPD	467	0,52
(3) schwere BPD	380	0,43
davon: Status bei Aufnahme bei (2) oder (3)		
(1) BPD ist während des stationären Aufenthaltes erstmalig aufgetreten	686	80,99
(2) BPD lag bereits bei Aufnahme vor	161	19,01

[18] mit erhöhtem Sauerstoffbedarf im Alter von 36+0 Wochen p. m.

Sauerstoffzufuhr, Beatmung und Bronchopulmonale Dysplasie (Überlebende im Alter > 36 vollendete Wochen bzw. nach Hause entlassene Kinder)

	Bund (gesamt)	
	n	%
Lebendgeborene Kinder mit endgültig (postnatal) bestimmtem Gestationsalter (vollendete Wochen) ≥ 22 SSW, die nicht im Kreißsaal verstorben sind oder bei denen dazu keine Angabe gemacht wurde (Überlebende im Alter > 36 vollendete Wochen p. m. oder nach Hause Entlassene)	**N = 86.466**	
Sauerstoffzufuhr jeglicher Art nach Aufnahme (von mehr als 30 Minuten)		
(0) nein	64.191	74,24
(1) ja	22.275	25,76
davon: Dauer der Sauerstoffzufuhr		
0 - 9 Tage	18.646	83,71
10 - 27 Tage	1.506	6,76
> 27 Tage	2.123	9,53
Beatmung (von mehr als 30 Minuten)		
(0) keine Atemhilfe	51.326	59,36
(1) nur nasale / pharyngeale Beatmung	29.346	33,94
(2) nur intratracheale Beatmung	641	0,74
(3) nasale / pharyngeale und intratracheale Beatmung	5.153	5,96
davon: Beatmungsdauer bei (1), (2) oder (3)		
0 - 7 Tage	28.931	82,33
8 - 14 Tage	2.285	6,50
15 - 21 Tage	907	2,58
22 - 28 Tage	693	1,97
> 28 Tage	2.324	6,61

Sauerstoffzufuhr, Beatmung und Bronchopulmonale Dysplasie (Überlebende im Alter > 36 vollendete Wochen bzw. nach Hause entlassene Kinder)

	Bund (gesamt)	
	n	**%**
Lebendgeborene Kinder mit endgültig (postnatal) bestimmtem Gestationsalter (vollendete Wochen) ≥ 22 SSW, die nicht im Kreißsaal verstorben sind oder bei denen dazu keine Angabe gemacht wurde (Überlebende im Alter > 36 vollendete Wochen p. m. oder nach Hause Entlassene)	**N = 86.466**	
Bronchopulmonale Dysplasie (BPD)[19]		
(0) weder moderate noch schwere BPD	85.742	99,16
(2) moderate BPD	397	0,46
(3) schwere BPD	327	0,38
davon: Status bei Aufnahme bei (2) oder (3)		
(1) BPD ist während des stationären Aufenthaltes erstmalig aufgetreten	641	88,54
(2) BPD lag bereits bei Aufnahme vor	83	11,46

[19] mit erhöhtem Sauerstoffbedarf im Alter von 36+0 Wochen p. m.

	Bund (gesamt)	
	n	**%**
Lebendgeborene Kinder mit endgültig (postnatal) bestimmtem Gestationsalter (vollendete Wochen) ≥ 22 SSW, die nicht im Kreißsaal verstorben sind oder bei denen dazu keine Angabe gemacht wurde	**N = 89.202**	
Pneumothorax		
nein	87.863	98,50
ja, Pneumothorax	1.339	1,50
davon		
ja, ohne jegliche vorangehende oder bestehende Atemhilfe/Beatmung aufgetreten	279	20,84
ja, nach oder unter irgendeiner Form von Atemhilfe/Beatmung aufgetreten	1.060	79,16
davon: Ort und Zeitpunkt des Auftretens eines Pneumothorax		
(1) während Behandlung in der Neonatologie des eigenen Standortes aufgetreten	864	64,53
(2) bei Aufnahme aus dem Kreißsaal/der Geburtshilfe nach Erstversorgung durch ein Team des eigenen Standortes	338	25,24
(3) bei Verlegung aus der Neonatologie/Kinderklinik eines anderen Standortes schon bestehend	137	10,23
davon: Behandlung des Pneumothorax		
(0) nein, keine Punktion oder Drainage	619	46,23
(1) ja, Einmalpunktion	71	5,30
(2) ja, mehrere Punktionen oder Pleuradrainage	649	48,47

Pneumothorax mit Beatmung (von mehr als 30 Minuten) durchgeführt

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Gesamtkollektiv.

	keine Atemhilfe	nur nasale / pharyngeale Beatmung	nur intra-tracheale Beatmung	nasale / pharyngeale und intra-tracheale Beatmung	Gesamt
Lebendgeborene Kinder mit endgültig (postnatal) bestimmtem Gestationsalter (vollendete Wochen) ≥ 22 SSW, die nicht im Kreißsaal verstorben sind oder bei denen dazu keine Angabe gemacht wurde					
Bund (gesamt)					
nein	51.880 **58,16 %**	29.801 **33,41 %**	842 **0,94 %**	5.340 **5,99 %**	87.863 **98,50 %**
ja, ohne jegliche vorangehende oder bestehende Atemhilfe/Beatmung aufgetreten	35 **0,04 %**	173 **0,19 %**	12 **0,01 %**	59 **0,07 %**	279 **0,31 %**
ja, nach oder unter irgendeiner Form von Atemhilfe/Beatmung aufgetreten	28 **0,03 %**	468 **0,52 %**	75 **0,08 %**	489 **0,55 %**	1.060 **1,19 %**
Gesamt	51.943 **58,23 %**	30.442 **34,13 %**	929 **1,04 %**	5.888 **6,60 %**	89.202 **100,00 %**

	Bund (gesamt)	
	n	%
Lebendgeborene Kinder mit endgültig (postnatal) bestimmtem Gestationsalter (vollendete Wochen) ≥ 22 SSW, die nicht im Kreißsaal verstorben sind oder bei denen dazu keine Angabe gemacht wurde	**N = 89.202**	
Pneumonie		
(0) nein, keine Pneumonie während des stationären Aufenthalts	88.109	98,77
(1) ja, Pneumonie während des stationären Aufenthalts	1.093	1,23

	Bund (gesamt)	
	n	**%**
Lebendgeborene Kinder mit endgültig (postnatal) bestimmtem Gestationsalter (vollendete Wochen) ≥ 22 SSW, die nicht im Kreißsaal verstorben sind oder bei denen dazu keine Angabe gemacht wurde	**N = 89.202**	
Sepsis		
(0) nein	85.491	95,84
(1) ja	3.711	4,16
davon		
Beginn innerhalb von 72 Stunden nach Geburt	2.463	66,37
Beginn später als 72 Stunden nach Geburt	1.248	33,63
Perinatale Hypoxie/Ischämie (Asphyxie)		
(0) nein	86.563	97,04
perinatale Hypoxie/Ischämie (Asphyxie)	2.639	2,96
davon		
(1) ja, ohne therapeutische Hypothermie	1.900	72,00
(2) ja, mit therapeutischer Hypothermie	739	28,00
davon: HIE (Hypoxisch ischämische Enzephalopathie) bei (1) oder (2)		
(0) nein	1.739	65,90
(1) ja	900	34,10
nekrotisierende Enterokolitis (NEK) (Stadium II oder III)		
(0) nein	88.826	99,58
(1) ja	376	0,42
davon		
(1) NEK ist während des stationären Aufenthaltes erstmalig aufgetreten	312	82,98
(2) NEK lag bereits bei Aufnahme vor	64	17,02

	Bund (gesamt)	
	n	**%**
Lebendgeborene Kinder mit endgültig (postnatal) bestimmtem Gestationsalter (vollendete Wochen) ≥ 22 SSW, die nicht im Kreißsaal verstorben sind oder bei denen dazu keine Angabe gemacht wurde	**N = 89.202**	
fokale intestinale Perforation (FIP) / singuläre intestinale Perforation (SIP)		
(0) nein	88.961	99,73
(1) ja	241	0,27
davon		
(1) FIP/SIP ist während des stationären Aufenthaltes erstmalig aufgetreten	202	83,82
(2) FIP/SIP lag bereits bei Aufnahme vor	39	16,18
Hörscreening		
(0) nein	4.218	4,73
(1) Hörscreening im aktuellen Aufenthalt durchgeführt	81.715	91,61
(2) Hörscreening in einem vorherigen Aufenthalt durchgeführt	3.269	3,66

Operation(en) und Prozeduren

Operation(en) und Prozeduren während des aktuellen stationären Aufenthaltes

	Bund (gesamt)	
	n	%
Lebendgeborene Kinder mit endgültig (postnatal) bestimmtem Gestationsalter (vollendete Wochen) ≥ 22 SSW, die nicht im Kreißsaal verstorben sind oder bei denen dazu keine Angabe gemacht wurde	**N = 89.202**	
OP oder Therapie einer ROP (Frühgeborenenretinopathie)		
(0) nein	88.884	99,64
OP oder Therapie einer ROP (Frühgeborenenretinopathie)	318	0,36
davon		
(1) ja, Lasertherapie oder Kryotherapie	69	21,70
(2) ja, intravitreale Anti-VEGF-Therapie	239	75,16
(3) ja, sonstige	10	3,14
OP oder sonstige invasive Therapie einer NEK (nekrotisierende Enterokolitis)		
(0) nein	88.970	99,74
OP oder Therapie einer NEK (nekrotisierende Enterokolitis)	232	0,26
davon		
(1) ja, Laparotomie	177	76,29
(2) ja, Drainage/Lavage	≤3	x
(3) ja, Drainage/Lavage und Laparotomie	53	22,84

Operation(en) und Prozeduren

Operation(en) und Prozeduren während des aktuellen stationären Aufenthaltes

	Bund (gesamt)	
	n	%
Lebendgeborene Kinder mit endgültig (postnatal) bestimmtem Gestationsalter (vollendete Wochen) ≥ 22 SSW, die nicht im Kreißsaal verstorben sind oder bei denen dazu keine Angabe gemacht wurde	**N = 89.202**	
OP oder sonstige invasive Therapie einer fokalen intestinalen Perforation (FIP) / singulären intestinalen Perforation (SIP)		
(0) nein	88.959	99,73
OP oder sonstige invasive Therapie einer fokalen intestinalen Perforation (FIP) / singulären intestinalen Perforation (SIP)	243	0,27
davon		
(1) ja, Laparotomie	205	84,36
(2) ja, Drainage/Lavage	6	2,47
(3) ja, Drainage/Lavage und Laparotomie	32	13,17
OP eines posthämorrhagischen Hydrozephalus		
(0) nein	88.930	99,70
(1) ja	272	0,30

Entlassung

	Bund (gesamt)	
	n	%
Lebendgeborene Kinder mit endgültig (postnatal) bestimmtem Gestationsalter (vollendete Wochen) ≥ 22 SSW, die nicht im Kreißsaal verstorben sind oder bei denen dazu keine Angabe gemacht wurde und die lebend entlassen oder verlegt wurden	**N = 88.205**	
Ernährung des Kindes bei Entlassung nach Hause / bei Verlegung		
(1) ausschließlich mit Frauenmilch ernährt	44.647	50,62
(2) teilweise mit Frauenmilch ernährt	32.398	36,73
(3) ausschließlich mit Formula ernährt	11.160	12,65

	Bund (gesamt)	
	n	%
Lebendgeborene Kinder	**N = 89.652**	
Entlassungsgrund		
(01) Behandlung regulär beendet	75.658	84,39
(02) Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	8.330	9,29
(03) Behandlung aus sonstigen Gründen beendet	78	0,09
(04) Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet	589	0,66
(05) Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers	≤3	x
(06) Verlegung in ein anderes Krankenhaus	3.216	3,59
(07) Tod	1.442	1,61
(08) Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit[20]	121	0,13
(09) Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung	68	0,08
(10) Entlassung in eine Pflegeeinrichtung	27	0,03
(11) Entlassung in ein Hospiz	9	0,01
(13) Externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung	0	0,00
(14) Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	16	0,02
(15) Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	42	0,05
(17) Interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen[21]	20	0,02
(22) Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung	0	0,00
(25) Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr[22]	0	0,00
(30) Behandlung regulär beendet, Überleitung in die Übergangspflege	8	0,01
nicht spezifizierter Entlassungsgrund[23]		
(1) ja	25	0,03

	Bund (gesamt)	
	n	%
Lebendgeborene Kinder	**N = 89.652**	
Mortalität und Lebenstage		
Verstorbene Kinder	1.442	1,61
davon		
≤ 7. Lebenstag	1.037	71,91
8. - 28. Lebenstag	245	16,99
≥ 29. Lebenstag	160	11,10

[20] § 14 Abs. 5 Satz 2 BPflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung

[21] nach der BPflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG

[22] für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV

[23] z.B. unterjährig aufgenommene Entlassungsgründe (ebenfalls nach § 301-Vereinbarung)

VLBW-Auswertung (Lebendgeborene Kinder mit Geburtsgewicht < 1.500 g)

VLBW: Very Low Birth Weight

	Bund (gesamt)	
	n	%
Lebendgeborene Kinder mit Geburtsgewicht < 1.500 g	**N = 8.004**	
Aufnahmequartal		
Aufnahme in den Vorjahren (Überliegerinnen und Überlieger)	1.112	13,89
1. Quartal	1.965	24,55
2. Quartal	2.042	25,51
3. Quartal	1.948	24,34
4. Quartal	937	11,71

	Bund (gesamt)	
	n	%
Lebendgeborene Kinder mit Geburtsgewicht < 1.500 g	**N = 8.004**	
angeborene Erkrankungen		
(0) keine oder leichte angeborene Erkrankungen	7.603	94,99
(1) schwere oder letale angeborene Erkrankungen	401	5,01

Primärer Verzicht auf kurative Therapie

	Bund (gesamt)	
	n	%
Lebendgeborene Kinder mit Geburtsgewicht < 1.500 g	**N = 8.004**	
Primärer Verzicht auf kurative Therapie		
Primär palliative Therapie (ab Geburt)	384	4,80
davon: Verstorben im Kreißsaal		
(1) ja	360	93,75

Aufnahme

In den nachfolgenden Auswertungen werden ausschließlich lebend geborene Kinder mit Geburtsgewicht < 1.500 g berücksichtigt

Geburtsort nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

	< 22 SSW	22 SSW	23 SSW	24 SSW	25 SSW	26 SSW	27 SSW	28 SSW	29 SSW	30 SSW	31 SSW	≥ 32 SSW
Bund (gesamt)												
Gesamt	219 **100,00 %**	201 **100,00 %**	349 **100,00 %**	557 **100,00 %**	577 **100,00 %**	688 **100,00 %**	757 **100,00 %**	913 **100,00 %**	853 **100,00 %**	930 **100,00 %**	718 **100,00 %**	1.242 **100,00 %**
davon verstorben	218 **99,54 %**	150 **74,63 %**	130 **37,25 %**	114 **20,47 %**	78 **13,52 %**	58 **8,43 %**	44 **5,81 %**	32 **3,50 %**	25 **2,93 %**	26 **2,80 %**	13 **1,81 %**	34 **2,74 %**
Inborn	218 **99,54 %**	196 **97,51 %**	348 **99,71 %**	551 **98,92 %**	570 **98,79 %**	684 **99,42 %**	755 **99,74 %**	905 **99,12 %**	850 **99,65 %**	928 **99,78 %**	716 **99,72 %**	1.229 **98,95 %**
davon verstorben	217 **99,54 %**	148 **75,51 %**	129 **37,07 %**	112 **20,33 %**	77 **13,51 %**	57 **8,33 %**	44 **5,83 %**	32 **3,54 %**	24 **2,82 %**	26 **2,80 %**	13 **1,82 %**	34 **2,77 %**
Outborn	≤3 **x %**	5 **2,49 %**	≤3 **x %**	6 **1,08 %**	7 **1,21 %**	4 **0,58 %**	≤3 **x %**	8 **0,88 %**	≤3 **x %**	≤3 **x %**	≤3 **x %**	13 **1,05 %**
davon verstorben	≤3 **x %**	≤3 **x %**	≤3 **x %**	≤3 **x %**	≤3 **x %**	≤3 **x %**	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	≤3 **x %**	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**

© IQTIG 2026

Geburtsort nach Geburtsgewicht

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

	< 500 g	500 - 749 g	750 - 999 g	1000 - 1249 g	1250 - 1499 g	Gesamt
Bund (gesamt)						
Gesamt	703 **100,00 %**	1.382 **100,00 %**	1.692 **100,00 %**	1.878 **100,00 %**	2.349 **100,00 %**	8.004 **100,00 %**
davon verstorben	428 **60,88 %**	273 **19,75 %**	106 **6,26 %**	59 **3,14 %**	56 **2,38 %**	922 **11,52 %**
Inborn	697 **99,15 %**	1.371 **99,20 %**	1.686 **99,65 %**	1.862 **99,15 %**	2.334 **99,36 %**	7.950 **99,33 %**
davon verstorben	427 **61,26 %**	270 **19,69 %**	103 **6,11 %**	57 **3,06 %**	56 **2,40 %**	913 **11,48 %**
Outborn	6 **0,85 %**	11 **0,80 %**	6 **0,35 %**	16 **0,85 %**	15 **0,64 %**	54 **0,67 %**
davon verstorben	≤3 **x %**	≤3 **x %**	≤3 **x %**	≤3 **x %**	0 **0,00 %**	9 **16,67 %**

© IQTIG 2026

Aufnahmestatus nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)[24]

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

	< 22 SSW	22 SSW	23 SSW	24 SSW	25 SSW	26 SSW	27 SSW	28 SSW	29 SSW	30 SSW	31 SSW	≥ 32 SSW
Bund (gesamt)												
Gesamt	218 **100,00 %**	198 **100,00 %**	348 **100,00 %**	557 **100,00 %**	576 **100,00 %**	688 **100,00 %**	757 **100,00 %**	912 **100,00 %**	852 **100,00 %**	928 **100,00 %**	718 **100,00 %**	1.240 **100,00 %**
davon verstorben	217 **99,54 %**	149 **75,25 %**	130 **37,36 %**	114 **20,47 %**	78 **13,54 %**	58 **8,43 %**	44 **5,81 %**	32 **3,51 %**	25 **2,93 %**	26 **2,80 %**	13 **1,81 %**	34 **2,74 %**
Primäraufnahmen	218 **100,00 %**	184 **92,93 %**	309 **88,79 %**	481 **86,36 %**	513 **89,06 %**	610 **88,66 %**	683 **90,22 %**	838 **91,89 %**	808 **94,84 %**	881 **94,94 %**	681 **94,85 %**	1.182 **95,32 %**
davon verstorben	217 **99,54 %**	149 **80,98 %**	125 **40,45 %**	111 **23,08 %**	73 **14,23 %**	55 **9,02 %**	40 **5,86 %**	30 **3,58 %**	22 **2,72 %**	23 **2,61 %**	13 **1,91 %**	32 **2,71 %**
Sekundäraufnahmen	0 **0,00 %**	14 **7,07 %**	39 **11,21 %**	76 **13,64 %**	63 **10,94 %**	78 **11,34 %**	74 **9,78 %**	74 **8,11 %**	44 **5,16 %**	47 **5,06 %**	37 **5,15 %**	58 **4,68 %**
davon verstorben	0 **-**	0 **0,00 %**	5 **12,82 %**	≤3 **x %**	5 **7,94 %**	≤3 **x %**	4 **5,41 %**	≤3 **x %**	≤3 **x %**	≤3 **x %**	0 **0,00 %**	≤3 **x %**

[24] unter Ausschluss von Kindern mit Aufnahmestatus "sonstiges"

Aufnahmestatus nach Geburtsgewicht[25]

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

	< 500 g	500 - 749 g	750 - 999 g	1000 - 1249 g	1250 - 1499 g	Gesamt
Bund (gesamt)						
Gesamt	701 **100,00 %**	1.378 **100,00 %**	1.691 **100,00 %**	1.877 **100,00 %**	2.345 **100,00 %**	7.992 **100,00 %**
davon verstorben	427 **60,91 %**	272 **19,74 %**	106 **6,27 %**	59 **3,14 %**	56 **2,39 %**	920 **11,51 %**
Primäraufnahmen	648 **92,44 %**	1.217 **88,32 %**	1.540 **91,07 %**	1.751 **93,29 %**	2.232 **95,18 %**	7.388 **92,44 %**
davon verstorben	421 **64,97 %**	262 **21,53 %**	101 **6,56 %**	53 **3,03 %**	53 **2,37 %**	890 **12,05 %**
Sekundäraufnahmen	53 **7,56 %**	161 **11,68 %**	151 **8,93 %**	126 **6,71 %**	113 **4,82 %**	604 **7,56 %**
davon verstorben	6 **11,32 %**	10 **6,21 %**	5 **3,31 %**	6 **4,76 %**	≤3 **x %**	30 **4,97 %**

[25] unter Ausschluss von Kindern mit Aufnahmestatus "sonstiges"

Geburtsgewicht nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

	< 22 SSW	22 SSW	23 SSW	24 SSW	25 SSW	26 SSW	27 SSW	28 SSW	29 SSW	30 SSW	31 SSW	≥ 32 SSW
Bund (gesamt)												
Gesamt	219 **100,00 %**	201 **100,00 %**	349 **100,00 %**	557 **100,00 %**	577 **100,00 %**	688 **100,00 %**	757 **100,00 %**	913 **100,00 %**	853 **100,00 %**	930 **100,00 %**	718 **100,00 %**	1.242 **100,00 %**
davon verstorben	218 **99,54 %**	150 **74,63 %**	130 **37,25 %**	114 **20,47 %**	78 **13,52 %**	58 **8,43 %**	44 **5,81 %**	32 **3,50 %**	25 **2,93 %**	26 **2,80 %**	13 **1,81 %**	34 **2,74 %**
< 500 g	204 **93,15 %**	136 **67,66 %**	114 **32,66 %**	112 **20,11 %**	73 **12,65 %**	40 **5,81 %**	11 **1,45 %**	9 **0,99 %**	≤3 **x %**	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	≤3 **x %**
davon verstorben	204 **100,00 %**	105 **77,21 %**	50 **43,86 %**	35 **31,25 %**	18 **24,66 %**	10 **25,00 %**	0 **0,00 %**	4 **44,44 %**	≤3 **x %**	0 **-**	0 **-**	≤3 **x %**
500 - 749 g	15 **6,85 %**	63 **31,34 %**	232 **66,48 %**	384 **68,94 %**	266 **46,10 %**	181 **26,31 %**	121 **15,98 %**	60 **6,57 %**	27 **3,17 %**	20 **2,15 %**	6 **0,84 %**	7 **0,56 %**
davon verstorben	14 **93,33 %**	43 **68,25 %**	78 **33,62 %**	69 **17,97 %**	33 **12,41 %**	17 **9,39 %**	15 **12,40 %**	≤3 **x %**	≤3 **x %**	0 **0,00 %**	≤3 **x %**	0 **0,00 %**
750 - 999 g	0 **0,00 %**	≤3 **x %**	≤3 **x %**	61 **10,95 %**	233 **40,38 %**	401 **58,28 %**	334 **44,12 %**	283 **31,00 %**	144 **16,88 %**	105 **11,29 %**	67 **9,33 %**	59 **4,75 %**
davon verstorben	0 **-**	≤3 **x %**	≤3 **x %**	10 **16,39 %**	26 **11,16 %**	28 **6,98 %**	9 **2,69 %**	10 **3,53 %**	5 **3,47 %**	5 **4,76 %**	4 **5,97 %**	5 **8,47 %**

Geburtsgewicht nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

	< 22 SSW	22 SSW	23 SSW	24 SSW	25 SSW	26 SSW	27 SSW	28 SSW	29 SSW	30 SSW	31 SSW	≥ 32 SSW
1000 - 1249 g	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	5 **0,87 %**	66 **9,59 %**	267 **35,27 %**	416 **45,56 %**	337 **39,51 %**	308 **33,12 %**	216 **30,08 %**	263 **21,18 %**
davon verstorben	0 -	0 -	0 -	0 -	≤3 **x %**	≤3 **x %**	18 **6,74 %**	9 **2,16 %**	≤3 **x %**	12 **3,90 %**	4 **1,85 %**	9 **3,42 %**
1250 - 1499 g	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	24 **3,17 %**	145 **15,88 %**	343 **40,21 %**	497 **53,44 %**	429 **59,75 %**	911 **73,35 %**
davon verstorben	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	≤3 **x %**	7 **4,83 %**	15 **4,37 %**	9 **1,81 %**	4 **0,93 %**	19 **2,09 %**

Geburtsgewichtsperzentile nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)[26]

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

	< 22 SSW	22 SSW	23 SSW	24 SSW	25 SSW	26 SSW	27 SSW	28 SSW	29 SSW	30 SSW	31 SSW	≥ 32 SSW
Bund (gesamt)												
Gesamt	0 -	201 **100,00 %**	349 **100,00 %**	557 **100,00 %**	577 **100,00 %**	688 **100,00 %**	757 **100,00 %**	913 **100,00 %**	853 **100,00 %**	930 **100,00 %**	718 **100,00 %**	1.242 **100,00 %**
davon verstorben	0 -	150 **74,63 %**	130 **37,25 %**	114 **20,47 %**	78 **13,52 %**	58 **8,43 %**	44 **5,81 %**	32 **3,50 %**	25 **2,93 %**	26 **2,80 %**	13 **1,81 %**	34 **2,74 %**

Geburtsgewichtsperzentile nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)[26]

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

	< 22 SSW	22 SSW	23 SSW	24 SSW	25 SSW	26 SSW	27 SSW	28 SSW	29 SSW	30 SSW	31 SSW	≥ 32 SSW
< 10. Perzentile	0 -	21 **10,45 %**	33 **9,46 %**	69 **12,39 %**	72 **12,48 %**	58 **8,43 %**	59 **7,79 %**	64 **7,01 %**	73 **8,56 %**	115 **12,37 %**	175 **24,37 %**	972 **78,26 %**
davon verstorben	0 -	17 **80,95 %**	17 **51,52 %**	25 **36,23 %**	17 **23,61 %**	15 **25,86 %**	7 **11,86 %**	6 **9,38 %**	4 **5,48 %**	5 **4,35 %**	8 **4,57 %**	30 **3,09 %**
10 - 90. Perzentile	0 -	177 **88,06 %**	312 **89,40 %**	474 **85,10 %**	484 **83,88 %**	593 **86,19 %**	673 **88,90 %**	811 **88,83 %**	780 **91,44 %**	815 **87,63 %**	543 **75,63 %**	270 **21,74 %**
davon verstorben	0 -	131 **74,01 %**	111 **35,58 %**	87 **18,35 %**	58 **11,98 %**	42 **7,08 %**	34 **5,05 %**	24 **2,96 %**	21 **2,69 %**	21 **2,58 %**	5 **0,92 %**	4 **1,48 %**
> 90. Perzentile	0 -	≤3 **x %**	4 **1,15 %**	14 **2,51 %**	21 **3,64 %**	37 **5,38 %**	25 **3,30 %**	38 **4,16 %**	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**
davon verstorben	0 -	≤3 **x %**	≤3 **x %**	≤3 **x %**	≤3 **x %**	≤3 **x %**	≤3 **x %**	≤3 **x %**	0 -	0 -	0 -	0 -

[26] Für die Perzentilberechnung wurden die geschlechtsspezifischen Perzentilwerte für das Geburtsgewicht von Jungen und Mädchen für vollendete Schwangerschaftswochen nach Voigt et al. (2014) verwendet. Dabei werden Fälle mit einem Gestationsalter von 22+0 bis 43+0 SSW berücksichtigt. Die Gesamtzahl kann aufgrund dessen von der ursprünglichen Gesamtzahl abweichen.

Grundlage zur Perzentilberechnung: Voigt, M; Rochow, N; Schneider, KTM; Hagenah, HP; Straube, S; Scholz, R; et al. (2014): Neue Perzentilwerte für die Körpermaße neugeborener Einlinge: Ergebnisse der deutschen Perinatalerhebung der Jahre 2007–2011 unter Beteiligung aller 16 Bundesländer. Z Geburtshilfe Neonatol 218(05): 210-217. DOI: 10.1055/s-0034-1385857.

© IQTIG 2026

Einlinge / Mehrlinge nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

	< 22 SSW	22 SSW	23 SSW	24 SSW	25 SSW	26 SSW	27 SSW	28 SSW	29 SSW	30 SSW	31 SSW	≥ 32 SSW
Bund (gesamt)												
Gesamt	219 **100,00 %**	201 **100,00 %**	349 **100,00 %**	557 **100,00 %**	577 **100,00 %**	688 **100,00 %**	757 **100,00 %**	913 **100,00 %**	853 **100,00 %**	930 **100,00 %**	718 **100,00 %**	1.242 **100,00 %**
davon verstorben	218 **99,54 %**	150 **74,63 %**	130 **37,25 %**	114 **20,47 %**	78 **13,52 %**	58 **8,43 %**	44 **5,81 %**	32 **3,50 %**	25 **2,93 %**	26 **2,80 %**	13 **1,81 %**	34 **2,74 %**
Einlinge	177 **80,82 %**	142 **70,65 %**	273 **78,22 %**	450 **80,79 %**	419 **72,62 %**	509 **73,98 %**	578 **76,35 %**	636 **69,66 %**	621 **72,80 %**	642 **69,03 %**	477 **66,43 %**	888 **71,50 %**
davon verstorben	176 **99,44 %**	109 **76,76 %**	96 **35,16 %**	88 **19,56 %**	55 **13,13 %**	47 **9,23 %**	37 **6,40 %**	26 **4,09 %**	22 **3,54 %**	22 **3,43 %**	8 **1,68 %**	23 **2,59 %**
Zwillinge	37 **16,89 %**	54 **26,87 %**	73 **20,92 %**	104 **18,67 %**	125 **21,66 %**	165 **23,98 %**	156 **20,61 %**	247 **27,05 %**	217 **25,44 %**	253 **27,20 %**	221 **30,78 %**	325 **26,17 %**
davon verstorben	37 **100,00 %**	39 **72,22 %**	32 **43,84 %**	26 **25,00 %**	19 **15,20 %**	9 **5,45 %**	7 **4,49 %**	6 **2,43 %**	≤3 **x %**	4 **1,58 %**	5 **2,26 %**	9 **2,77 %**
≥ Drillinge	5 **2,28 %**	5 **2,49 %**	≤3 **x %**	≤3 **x %**	33 **5,72 %**	14 **2,03 %**	23 **3,04 %**	30 **3,29 %**	15 **1,76 %**	35 **3,76 %**	20 **2,79 %**	29 **2,33 %**
davon verstorben	5 **100,00 %**	≤3 **x %**	≤3 **x %**	0 **0,00 %**	4 **12,12 %**	≤3 **x %**	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	≤3 **x %**

© IQTIG 2026

Geschlecht nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

	< 22 SSW	22 SSW	23 SSW	24 SSW	25 SSW	26 SSW	27 SSW	28 SSW	29 SSW	30 SSW	31 SSW	≥ 32 SSW
Bund (gesamt)												
Gesamt	219 **100,00 %**	201 **100,00 %**	349 **100,00 %**	557 **100,00 %**	577 **100,00 %**	688 **100,00 %**	757 **100,00 %**	913 **100,00 %**	853 **100,00 %**	930 **100,00 %**	718 **100,00 %**	1.242 **100,00 %**
davon verstorben	218 **99,54 %**	150 **74,63 %**	130 **37,25 %**	114 **20,47 %**	78 **13,52 %**	58 **8,43 %**	44 **5,81 %**	32 **3,50 %**	25 **2,93 %**	26 **2,80 %**	13 **1,81 %**	34 **2,74 %**
männlich	114 **52,05 %**	111 **55,22 %**	199 **57,02 %**	288 **51,71 %**	291 **50,43 %**	408 **59,30 %**	419 **55,35 %**	490 **53,67 %**	442 **51,82 %**	470 **50,54 %**	342 **47,63 %**	571 **45,97 %**
davon verstorben	114 **100,00 %**	85 **76,58 %**	80 **40,20 %**	52 **18,06 %**	40 **13,75 %**	41 **10,05 %**	20 **4,77 %**	19 **3,88 %**	19 **4,30 %**	12 **2,55 %**	4 **1,17 %**	9 **1,58 %**
weiblich	104 **47,49 %**	90 **44,78 %**	150 **42,98 %**	268 **48,11 %**	286 **49,57 %**	280 **40,70 %**	338 **44,65 %**	423 **46,33 %**	411 **48,18 %**	460 **49,46 %**	376 **52,37 %**	669 **53,86 %**
davon verstorben	103 **99,04 %**	65 **72,22 %**	50 **33,33 %**	62 **23,13 %**	38 **13,29 %**	17 **6,07 %**	24 **7,10 %**	13 **3,07 %**	6 **1,46 %**	14 **3,04 %**	9 **2,39 %**	24 **3,59 %**
divers	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**
davon verstorben	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -

Geschlecht nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

	< 22 SSW	22 SSW	23 SSW	24 SSW	25 SSW	26 SSW	27 SSW	28 SSW	29 SSW	30 SSW	31 SSW	≥ 32 SSW
unbestimmt	≤3 **x %**	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	≤3 **x %**	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	≤3 **x %**
davon verstorben	≤3 **x %**	0 **-**	0 **-**	0 **0,00 %**	0 **-**	0 **-**	0 **-**	0 **-**	0 **-**	0 **-**	0 **-**	≤3 **x %**

Aufnahmetemperatur nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen) - Primäraufnahmen[27]

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

	22 SSW	23 SSW	24 SSW	25 SSW	26 SSW	27 SSW	28 SSW	29 SSW	30 SSW	31 SSW	≥ 32 SSW	Gesamt
Bund (gesamt)												
Gesamt	101 **100,00 %**	309 **100,00 %**	552 **100,00 %**	568 **100,00 %**	685 **100,00 %**	756 **100,00 %**	908 **100,00 %**	850 **100,00 %**	925 **100,00 %**	713 **100,00 %**	1.227 **100,00 %**	7.594 **100,00 %**
davon verstorben	52 **51,49 %**	91 **29,45 %**	109 **19,75 %**	70 **12,32 %**	55 **8,03 %**	43 **5,69 %**	28 **3,08 %**	23 **2,71 %**	23 **2,49 %**	8 **1,12 %**	21 **1,71 %**	523 **6,89 %**
Primäraufnahmen	87 **86,14 %**	270 **87,38 %**	476 **86,23 %**	505 **88,91 %**	607 **88,61 %**	682 **90,21 %**	834 **91,85 %**	806 **94,82 %**	878 **94,92 %**	676 **94,81 %**	1.169 **95,27 %**	6.990 **92,05 %**
davon verstorben	52 **59,77 %**	86 **31,85 %**	106 **22,27 %**	65 **12,87 %**	52 **8,57 %**	39 **5,72 %**	26 **3,12 %**	20 **2,48 %**	20 **2,28 %**	8 **1,18 %**	19 **1,63 %**	493 **7,05 %**
davon < 32,0 °C	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	≤3 **x %**	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	≤3 **x %**
davon verstorben	0 -	0 -	0 -	0 **0,00 %**	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 **0,00 %**
davon 32,0 - 33,9 °C	≤3 **x %**	≤3 **x %**	5 **1,05 %**	0 **0,00 %**	≤3 **x %**	0 **0,00 %**	4 **0,48 %**	0 **0,00 %**	≤3 **x %**	≤3 **x %**	≤3 **x %**	21 **0,30 %**
davon verstorben	≤3 **x %**	≤3 **x %**	≤3 **x %**	0 -	≤3 **x %**	0 -	0 **0,00 %**	0 -	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	≤3 **x %**	9 **42,86 %**

Aufnahmetemperatur nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen) - Primäraufnahmen[27]

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

	22 SSW	23 SSW	24 SSW	25 SSW	26 SSW	27 SSW	28 SSW	29 SSW	30 SSW	31 SSW	≥ 32 SSW	Gesamt
davon 34,0 - 35,9 °C	14 **16,09 %**	38 **14,07 %**	48 **10,08 %**	37 **7,33 %**	32 **5,27 %**	28 **4,11 %**	16 **1,92 %**	14 **1,74 %**	28 **3,19 %**	15 **2,22 %**	55 **4,70 %**	325 **4,65 %**
davon verstorben	7 **50,00 %**	10 **26,32 %**	9 **18,75 %**	7 **18,92 %**	5 **15,63 %**	4 **14,29 %**	≤3 **x %**	≤3 **x %**	0 **0,00 %**	≤3 **x %**	≤3 **x %**	46 **14,15 %**
davon 36,0 - 37,5 °C	58 **66,67 %**	201 **74,44 %**	382 **80,25 %**	397 **78,61 %**	471 **77,59 %**	550 **80,65 %**	700 **83,93 %**	666 **82,63 %**	736 **83,83 %**	609 **90,09 %**	1.029 **88,02 %**	5.799 **82,96 %**
davon verstorben	31 **53,45 %**	58 **28,86 %**	78 **20,42 %**	48 **12,09 %**	37 **7,86 %**	24 **4,36 %**	24 **3,43 %**	13 **1,95 %**	13 **1,77 %**	5 **0,82 %**	10 **0,97 %**	341 **5,88 %**
davon > 37,5 °C	≤3 **x %**	18 **6,67 %**	35 **7,35 %**	62 **12,28 %**	94 **15,49 %**	97 **14,22 %**	110 **13,19 %**	118 **14,64 %**	107 **12,19 %**	47 **6,95 %**	74 **6,33 %**	764 **10,93 %**
davon verstorben	≤3 **x %**	7 **38,89 %**	12 **34,29 %**	6 **9,68 %**	5 **5,32 %**	7 **7,22 %**	0 **0,00 %**	≤3 **x %**	4 **3,74 %**	≤3 **x %**	≤3 **x %**	48 **6,28 %**

[27] Berücksichtigt werden Kinder mit endgültig (postnatal) bestimmtem Gestationsalter (vollendete Wochen) ≥ 22 SSW, die nicht im Kreißsaal verstorben sind oder bei denen dazu keine Angabe gemacht wurde und unter Ausschluss von Kindern mit Aufnahmestatus "sonstiges".

Diagnostik und Therapie

In den nachfolgenden Auswertungen werden ausschließlich lebend geborene Kinder mit Geburtsgewicht < 1.500 g berücksichtigt

© IQTIG 2026

Operationen nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)[28]

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

	22 SSW	23 SSW	24 SSW	25 SSW	26 SSW	27 SSW	28 SSW	29 SSW	30 SSW	31 SSW	≥ 32 SSW	Gesamt
Bund (gesamt)												
Gesamt	104 **100,00 %**	310 **100,00 %**	552 **100,00 %**	569 **100,00 %**	685 **100,00 %**	756 **100,00 %**	909 **100,00 %**	851 **100,00 %**	927 **100,00 %**	713 **100,00 %**	1.229 **100,00 %**	7.605 **100,00 %**
davon verstorben	53 **50,96 %**	91 **29,35 %**	109 **19,75 %**	70 **12,30 %**	55 **8,03 %**	43 **5,69 %**	28 **3,08 %**	23 **2,70 %**	23 **2,48 %**	8 **1,12 %**	21 **1,71 %**	524 **6,89 %**
Operation einer ROP	18 **17,31 %**	64 **20,65 %**	85 **15,40 %**	49 **8,61 %**	23 **3,36 %**	14 **1,85 %**	5 **0,55 %**	≤3 **x %**	5 **0,54 %**	0 **0,00 %**	≤3 **x %**	267 **3,51 %**
davon verstorben	0 **0,00 %**	≤3 **x %**	0 **0,00 %**	≤3 **x %**	≤3 **x %**	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	0 **-**	0 **0,00 %**	4 **1,50 %**
OP oder sonstige invasive Therapie einer NEK	4 **3,85 %**	14 **4,52 %**	35 **6,34 %**	22 **3,87 %**	27 **3,94 %**	25 **3,31 %**	18 **1,98 %**	6 **0,71 %**	8 **0,86 %**	≤3 **x %**	≤3 **x %**	164 **2,16 %**
davon verstorben	0 **0,00 %**	4 **28,57 %**	10 **28,57 %**	6 **27,27 %**	8 **29,63 %**	4 **16,00 %**	5 **27,78 %**	≤3 **x %**	≤3 **x %**	0 **0,00 %**	≤3 **x %**	43 **26,22 %**
OP oder sonstige invasive Therapie einer FIP / SIP	9 **8,65 %**	33 **10,65 %**	51 **9,24 %**	33 **5,80 %**	13 **1,90 %**	15 **1,98 %**	6 **0,66 %**	11 **1,29 %**	5 **0,54 %**	≤3 **x %**	≤3 **x %**	182 **2,39 %**
davon verstorben	≤3 **x %**	8 **24,24 %**	11 **21,57 %**	6 **18,18 %**	≤3 **x %**	≤3 **x %**	0 **0,00 %**	≤3 **x %**	≤3 **x %**	≤3 **x %**	0 **0,00 %**	35 **19,23 %**

Operationen nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)[28]

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

	22 SSW	23 SSW	24 SSW	25 SSW	26 SSW	27 SSW	28 SSW	29 SSW	30 SSW	31 SSW	≥ 32 SSW	Gesamt
Operation eines posthämorrhagischen Hydrozephalus	≤3 **x %**	14 **4,52 %**	26 **4,71 %**	26 **4,57 %**	22 **3,21 %**	13 **1,72 %**	12 **1,32 %**	8 **0,94 %**	5 **0,54 %**	≤3 **x %**	5 **0,41 %**	135 **1,78 %**
davon verstorben	0 **0,00 %**	≤3 **x %**	≤3 **x %**	≤3 **x %**	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	≤3 **x %**	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	7 **5,19 %**

[28] Berücksichtigt werden Kinder mit endgültig (postnatal) bestimmtem Gestationsalter (vollendete Wochen) ≥ 22 SSW, die nicht im Kreißsaal verstorben sind oder bei denen dazu keine Angabe gemacht wurde. Mehrfachnennung möglich

Sauerstoffzufuhr und Beatmung nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)[29]

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

	22 SSW	23 SSW	24 SSW	25 SSW	26 SSW	27 SSW	28 SSW	29 SSW	30 SSW	31 SSW	≥ 32 SSW	Gesamt
Bund (gesamt)												
Gesamt	104 **100,00 %**	310 **100,00 %**	552 **100,00 %**	569 **100,00 %**	685 **100,00 %**	756 **100,00 %**	909 **100,00 %**	851 **100,00 %**	927 **100,00 %**	713 **100,00 %**	1.229 **100,00 %**	7.605 **100,00 %**

Sauerstoffzufuhr und Beatmung nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)[29]

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

	22 SSW	23 SSW	24 SSW	25 SSW	26 SSW	27 SSW	28 SSW	29 SSW	30 SSW	31 SSW	≥ 32 SSW	Gesamt
Lebend entlassene Kinder ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne zusätzlichen Sauerstoffbedarf bei Entlassung / Verlegung	35 **33,65 %**	152 **49,03 %**	324 **58,70 %**	412 **72,41 %**	566 **82,63 %**	647 **85,58 %**	841 **92,52 %**	798 **93,77 %**	885 **95,47 %**	691 **96,91 %**	1.197 **97,40 %**	6.548 **86,10 %**
davon O2-Zufuhr	33 **94,29 %**	140 **92,11 %**	297 **91,67 %**	380 **92,23 %**	503 **88,87 %**	544 **84,08 %**	649 **77,17 %**	579 **72,56 %**	573 **64,75 %**	393 **56,87 %**	403 **33,67 %**	4.494 **68,63 %**
davon Beatmete Kinder	34 **97,14 %**	148 **97,37 %**	312 **96,30 %**	392 **95,15 %**	547 **96,64 %**	622 **96,14 %**	789 **93,82 %**	772 **96,74 %**	837 **94,58 %**	634 **91,75 %**	868 **72,51 %**	5.955 **90,94 %**
davon nur nasale / pharyngeale Beatmung	10 **29,41 %**	19 **12,84 %**	67 **21,47 %**	136 **34,69 %**	281 **51,37 %**	382 **61,41 %**	596 **75,54 %**	606 **78,50 %**	697 **83,27 %**	556 **87,70 %**	789 **90,90 %**	4.139 **69,50 %**
davon nur intratracheale Beatmung	0 **0,00 %**	≤3 **x %**	≤3 **x %**	≤3 **x %**	≤3 **x %**	≤3 **x %**	0 **0,00 %**	5 **0,65 %**	4 **0,48 %**	4 **0,63 %**	≤3 **x %**	26 **0,44 %**
davon nasale / pharyngeale und intratracheale Beatmung	24 **70,59 %**	127 **85,81 %**	244 **78,21 %**	253 **64,54 %**	264 **48,26 %**	238 **38,26 %**	193 **24,46 %**	161 **20,85 %**	136 **16,25 %**	74 **11,67 %**	76 **8,76 %**	1.790 **30,06 %**
davon Kinder ohne Atemhilfe	≤3 **x %**	4 **2,63 %**	12 **3,70 %**	20 **4,85 %**	19 **3,36 %**	25 **3,86 %**	52 **6,18 %**	26 **3,26 %**	48 **5,42 %**	57 **8,25 %**	329 **27,49 %**	593 **9,06 %**

[29] Berücksichtigt werden Kinder mit endgültig (postnatal) bestimmtem Gestationsalter (vollendete Wochen) ≥ 22 SSW, die nicht im Kreißsaal verstorben sind oder bei denen dazu keine Angabe gemacht wurde.

© IQTIG 2026

Dauer der Sauerstoffzufuhr nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)[30]

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

	22 SSW	23 SSW	24 SSW	25 SSW	26 SSW	27 SSW	28 SSW	29 SSW	30 SSW	31 SSW	≥ 32 SSW	Gesamt
Bund (gesamt)												
Gesamt	104 **100,00 %**	310 **100,00 %**	552 **100,00 %**	569 **100,00 %**	685 **100,00 %**	756 **100,00 %**	909 **100,00 %**	851 **100,00 %**	927 **100,00 %**	713 **100,00 %**	1.229 **100,00 %**	7.605 **100,00 %**
Lebend entlassene Kinder ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne zusätzlichen Sauerstoffbedarf bei Entlassung / Verlegung	35 **33,65 %**	152 **49,03 %**	324 **58,70 %**	412 **72,41 %**	566 **82,63 %**	647 **85,58 %**	841 **92,52 %**	798 **93,77 %**	885 **95,47 %**	691 **96,91 %**	1.197 **97,40 %**	6.548 **86,10 %**
davon O2-Zufuhr	33 **94,29 %**	140 **92,11 %**	297 **91,67 %**	380 **92,23 %**	503 **88,87 %**	544 **84,08 %**	649 **77,17 %**	579 **72,56 %**	573 **64,75 %**	393 **56,87 %**	403 **33,67 %**	4.494 **68,63 %**
davon 0 - 7 Tage	≤3 **x %**	5 **3,57 %**	11 **3,70 %**	36 **9,47 %**	108 **21,47 %**	210 **38,60 %**	331 **51,00 %**	408 **70,47 %**	467 **81,50 %**	337 **85,75 %**	350 **86,85 %**	2.265 **50,40 %**
davon 8 - 14 Tage	4 **12,12 %**	≤3 **x %**	8 **2,69 %**	11 **2,89 %**	19 **3,78 %**	38 **6,99 %**	42 **6,47 %**	27 **4,66 %**	30 **5,24 %**	18 **4,58 %**	19 **4,71 %**	219 **4,87 %**
davon 15 - 21 Tage	≤3 **x %**	≤3 **x %**	4 **1,35 %**	12 **3,16 %**	40 **7,95 %**	39 **7,17 %**	46 **7,09 %**	30 **5,18 %**	23 **4,01 %**	14 **3,56 %**	6 **1,49 %**	217 **4,83 %**
davon 22 - 28 Tage	≤3 **x %**	4 **2,86 %**	6 **2,02 %**	26 **6,84 %**	54 **10,74 %**	46 **8,46 %**	62 **9,55 %**	32 **5,53 %**	17 **2,97 %**	7 **1,78 %**	6 **1,49 %**	261 **5,81 %**

Dauer der Sauerstoffzufuhr nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)[30]

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

	22 SSW	23 SSW	24 SSW	25 SSW	26 SSW	27 SSW	28 SSW	29 SSW	30 SSW	31 SSW	≥ 32 SSW	Gesamt
davon > 28 Tage	24 **72,73 %**	127 **90,71 %**	268 **90,24 %**	295 **77,63 %**	282 **56,06 %**	211 **38,79 %**	168 **25,89 %**	82 **14,16 %**	36 **6,28 %**	17 **4,33 %**	22 **5,46 %**	1.532 **34,09 %**

[30] Berücksichtigt werden Kinder mit endgültig (postnatal) bestimmtem Gestationsalter (vollendete Wochen) ≥ 22 SSW, die nicht im Kreißsaal verstorben sind oder bei denen dazu keine Angabe gemacht wurde.

Dauer der Beatmungsart nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)

Nasale / pharyngeale Beatmung[31]

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

	22 SSW	23 SSW	24 SSW	25 SSW	26 SSW	27 SSW	28 SSW	29 SSW	30 SSW	31 SSW	≥ 32 SSW	Gesamt
Bund (gesamt)												
Gesamt	104 **100,00 %**	310 **100,00 %**	552 **100,00 %**	569 **100,00 %**	685 **100,00 %**	756 **100,00 %**	909 **100,00 %**	851 **100,00 %**	927 **100,00 %**	713 **100,00 %**	1.229 **100,00 %**	7.605 **100,00 %**
Lebend entlassene Kinder ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne zusätzlichen Sauerstoffbedarf bei Entlassung / Verlegung	35 **33,65 %**	152 **49,03 %**	324 **58,70 %**	412 **72,41 %**	566 **82,63 %**	647 **85,58 %**	841 **92,52 %**	798 **93,77 %**	885 **95,47 %**	691 **96,91 %**	1.197 **97,40 %**	6.548 **86,10 %**

Dauer der Beatmungsart nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)

Nasale / pharyngeale Beatmung[31]

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

	22 SSW	23 SSW	24 SSW	25 SSW	26 SSW	27 SSW	28 SSW	29 SSW	30 SSW	31 SSW	≥ 32 SSW	Gesamt
davon nur nasale / pharyngeale Beatmung	10 **28,57 %**	19 **12,50 %**	67 **20,68 %**	136 **33,01 %**	281 **49,65 %**	382 **59,04 %**	596 **70,87 %**	606 **75,94 %**	697 **78,76 %**	556 **80,46 %**	789 **65,91 %**	4.139 **63,21 %**
davon 0 - 7 Tage	≤3 **x %**	5 **26,32 %**	10 **14,93 %**	5 **3,68 %**	13 **4,63 %**	14 **3,66 %**	29 **4,87 %**	89 **14,69 %**	211 **30,27 %**	294 **52,88 %**	576 **73,00 %**	1.248 **30,15 %**
davon 8 - 14 Tage	0 **0,00 %**	≤3 **x %**	≤3 **x %**	5 **3,68 %**	6 **2,14 %**	16 **4,19 %**	56 **9,40 %**	104 **17,16 %**	184 **26,40 %**	124 **22,30 %**	124 **15,72 %**	623 **15,05 %**
davon 15 - 21 Tage	≤3 **x %**	0 **0,00 %**	7 **10,45 %**	≤3 **x %**	11 **3,91 %**	20 **5,24 %**	47 **7,89 %**	95 **15,68 %**	93 **13,34 %**	59 **10,61 %**	47 **5,96 %**	383 **9,25 %**
davon 22 - 28 Tage	0 **0,00 %**	≤3 **x %**	0 **0,00 %**	7 **5,15 %**	7 **2,49 %**	38 **9,95 %**	77 **12,92 %**	106 **17,49 %**	93 **13,34 %**	36 **6,47 %**	14 **1,77 %**	381 **9,21 %**
davon > 28 Tage	6 **60,00 %**	9 **47,37 %**	48 **71,64 %**	117 **86,03 %**	244 **86,83 %**	294 **76,96 %**	387 **64,93 %**	212 **34,98 %**	116 **16,64 %**	43 **7,73 %**	28 **3,55 %**	1.504 **36,34 %**

[31] Berücksichtigt werden Kinder mit endgültig (postnatal) bestimmtem Gestationsalter (vollendete Wochen) ≥ 22 SSW, die nicht im Kreißsaal verstorben sind oder bei denen dazu keine Angabe gemacht wurde.

© IQTIG 2026

Intratracheale Beatmung[32]

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

	22 SSW	23 SSW	24 SSW	25 SSW	26 SSW	27 SSW	28 SSW	29 SSW	30 SSW	31 SSW	≥ 32 SSW	Gesamt
Bund (gesamt)												
Gesamt	104 **100,00 %**	310 **100,00 %**	552 **100,00 %**	569 **100,00 %**	685 **100,00 %**	756 **100,00 %**	909 **100,00 %**	851 **100,00 %**	927 **100,00 %**	713 **100,00 %**	1.229 **100,00 %**	7.605 **100,00 %**
Lebend entlassene Kinder ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne zusätzlichen Sauerstoffbedarf bei Entlassung / Verlegung	35 **33,65 %**	152 **49,03 %**	324 **58,70 %**	412 **72,41 %**	566 **82,63 %**	647 **85,58 %**	841 **92,52 %**	798 **93,77 %**	885 **95,47 %**	691 **96,91 %**	1.197 **97,40 %**	6.548 **86,10 %**
davon Intratracheale Beatmung[34]	24 **68,57 %**	129 **84,87 %**	245 **75,62 %**	256 **62,14 %**	266 **47,00 %**	240 **37,09 %**	193 **22,95 %**	166 **20,80 %**	140 **15,82 %**	78 **11,29 %**	79 **6,60 %**	1.816 **27,73 %**
davon 0 - 7 Tage	≤3 **x %**	≤3 **x %**	4 **1,63 %**	4 **1,56 %**	9 **3,38 %**	≤3 **x %**	≤3 **x %**	16 **9,64 %**	21 **15,00 %**	25 **32,05 %**	26 **32,91 %**	115 **6,33 %**
davon 8 - 14 Tage	≤3 **x %**	≤3 **x %**	≤3 **x %**	5 **1,95 %**	≤3 **x %**	7 **2,92 %**	10 **5,18 %**	25 **15,06 %**	28 **20,00 %**	17 **21,79 %**	12 **15,19 %**	112 **6,17 %**
davon 15 - 21 Tage	≤3 **x %**	0 **0,00 %**	≤3 **x %**	≤3 **x %**	7 **2,63 %**	8 **3,33 %**	5 **2,59 %**	24 **14,46 %**	18 **12,86 %**	8 **10,26 %**	7 **8,86 %**	80 **4,41 %**
davon 22 - 28 Tage	≤3 **x %**	0 **0,00 %**	≤3 **x %**	≤3 **x %**	4 **1,50 %**	10 **4,17 %**	17 **8,81 %**	15 **9,04 %**	21 **15,00 %**	6 **7,69 %**	7 **8,86 %**	83 **4,57 %**

Intratracheale Beatmung[32]

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

	22 SSW	23 SSW	24 SSW	25 SSW	26 SSW	27 SSW	28 SSW	29 SSW	30 SSW	31 SSW	≥ 32 SSW	Gesamt
davon > 28 Tage	20 **83,33 %**	124 **96,12 %**	236 **96,33 %**	245 **95,70 %**	244 **91,73 %**	212 **88,33 %**	158 **81,87 %**	86 **51,81 %**	52 **37,14 %**	22 **28,21 %**	27 **34,18 %**	1.426 **78,52 %**

[32] Berücksichtigt werden Kinder mit endgültig (postnatal) bestimmtem Gestationsalter (vollendete Wochen) ≥ 22 SSW, die nicht im Kreißsaal verstorben sind oder bei denen dazu keine Angabe gemacht wurde.

[34] intratracheale Beatmung oder nasale / pharyngeale und intratracheale Beatmung

Pneumothorax nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)[35]

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

	22 SSW	23 SSW	24 SSW	25 SSW	26 SSW	27 SSW	28 SSW	29 SSW	30 SSW	31 SSW	≥ 32 SSW	Gesamt
Bund (gesamt)												
Gesamt	104 **100,00 %**	310 **100,00 %**	552 **100,00 %**	569 **100,00 %**	685 **100,00 %**	756 **100,00 %**	909 **100,00 %**	851 **100,00 %**	927 **100,00 %**	713 **100,00 %**	1.229 **100,00 %**	7.605 **100,00 %**
kein Pneumothorax	93 **89,42 %**	291 **93,87 %**	515 **93,30 %**	535 **94,02 %**	653 **95,33 %**	719 **95,11 %**	883 **97,14 %**	829 **97,41 %**	897 **96,76 %**	699 **98,04 %**	1.220 **99,27 %**	7.334 **96,44 %**
Pneumothorax	11 **10,58 %**	19 **6,13 %**	37 **6,70 %**	34 **5,98 %**	32 **4,67 %**	37 **4,89 %**	26 **2,86 %**	22 **2,59 %**	30 **3,24 %**	14 **1,96 %**	9 **0,73 %**	271 **3,56 %**
davon ohne jegliche vorangehende oder bestehende Atemhilfe/Beatmung aufgetreten	≤3 **x %**	≤3 **x %**	≤3 **x %**	≤3 **x %**	≤3 **x %**	≤3 **x %**	4 **15,38 %**	0 **0,00 %**	≤3 **x %**	≤3 **x %**	≤3 **x %**	23 **8,49 %**
davon nach oder unter irgendeiner Form von Atemhilfe/Beatmung aufgetreten	10 **90,91 %**	17 **89,47 %**	34 **91,89 %**	32 **94,12 %**	30 **93,75 %**	35 **94,59 %**	22 **84,62 %**	22 **100,00 %**	27 **90,00 %**	12 **85,71 %**	7 **77,78 %**	248 **91,51 %**

[35] Berücksichtigt werden Kinder mit endgültig (postnatal) bestimmtem Gestationsalter (vollendete Wochen) ≥ 22 SSW, die nicht im Kreißsaal verstorben sind oder bei denen dazu keine Angabe gemacht wurde.

© IQTIG 2026

Bronchopulmonale Dysplasie (BPD) nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)[36]

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

	22 SSW	23 SSW	24 SSW	25 SSW	26 SSW	27 SSW	28 SSW	29 SSW	30 SSW	31 SSW	≥ 32 SSW	Gesamt
Bund (gesamt)												
Gesamt	104 **100,00 %**	310 **100,00 %**	552 **100,00 %**	569 **100,00 %**	685 **100,00 %**	756 **100,00 %**	909 **100,00 %**	851 **100,00 %**	927 **100,00 %**	713 **100,00 %**	1.229 **100,00 %**	7.605 **100,00 %**
weder moderate noch schwere BPD	80 **76,92 %**	191 **61,61 %**	384 **69,57 %**	419 **73,64 %**	559 **81,61 %**	684 **90,48 %**	843 **92,74 %**	818 **96,12 %**	902 **97,30 %**	701 **98,32 %**	1.226 **99,76 %**	6.807 **89,51 %**
BPD	24 **23,08 %**	119 **38,39 %**	168 **30,43 %**	150 **26,36 %**	126 **18,39 %**	72 **9,52 %**	66 **7,26 %**	33 **3,88 %**	25 **2,70 %**	12 **1,68 %**	≤3 **x %**	798 **10,49 %**
davon moderate BPD	12 **50,00 %**	57 **47,90 %**	93 **55,36 %**	89 **59,33 %**	72 **57,14 %**	37 **51,39 %**	41 **62,12 %**	17 **51,52 %**	15 **60,00 %**	8 **66,67 %**	≤3 **x %**	443 **55,51 %**
davon schwere BPD	12 **50,00 %**	62 **52,10 %**	75 **44,64 %**	61 **40,67 %**	54 **42,86 %**	35 **48,61 %**	25 **37,88 %**	16 **48,48 %**	10 **40,00 %**	4 **33,33 %**	≤3 **x %**	355 **44,49 %**
davon BPD ist während des stationären Aufenthaltes erstmalig aufgetreten	18 **75,00 %**	101 **84,87 %**	137 **81,55 %**	126 **84,00 %**	102 **80,95 %**	53 **73,61 %**	56 **84,85 %**	26 **78,79 %**	21 **84,00 %**	10 **83,33 %**	≤3 **x %**	651 **81,58 %**
davon BPD lag bereits bei Aufnahme vor	6 **25,00 %**	18 **15,13 %**	31 **18,45 %**	24 **16,00 %**	24 **19,05 %**	19 **26,39 %**	10 **15,15 %**	7 **21,21 %**	4 **16,00 %**	≤3 **x %**	≤3 **x %**	147 **18,42 %**

[36] Berücksichtigt werden Kinder mit endgültig (postnatal) bestimmtem Gestationsalter (vollendete Wochen) ≥ 22 SSW, die nicht im Kreißsaal verstorben sind oder bei denen dazu keine Angabe gemacht wurde.

Sepsis/Pneumonie nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)[37]

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

	22 SSW	23 SSW	24 SSW	25 SSW	26 SSW	27 SSW	28 SSW	29 SSW	30 SSW	31 SSW	≥ 32 SSW	Gesamt
Bund (gesamt)												
Gesamt	104 **100,00 %**	310 **100,00 %**	552 **100,00 %**	569 **100,00 %**	685 **100,00 %**	756 **100,00 %**	909 **100,00 %**	851 **100,00 %**	927 **100,00 %**	713 **100,00 %**	1.229 **100,00 %**	7.605 **100,00 %**
Keine Sepsis	74 **71,15 %**	219 **70,65 %**	368 **66,67 %**	413 **72,58 %**	537 **78,39 %**	630 **83,33 %**	829 **91,20 %**	775 **91,07 %**	878 **94,71 %**	675 **94,67 %**	1.189 **96,75 %**	6.587 **86,61 %**
Sepsis	30 **28,85 %**	91 **29,35 %**	184 **33,33 %**	156 **27,42 %**	148 **21,61 %**	126 **16,67 %**	80 **8,80 %**	76 **8,93 %**	49 **5,29 %**	38 **5,33 %**	40 **3,25 %**	1.018 **13,39 %**
davon innerhalb 72 Stunden nach Geburt	12 **40,00 %**	20 **21,98 %**	40 **21,74 %**	39 **25,00 %**	36 **24,32 %**	49 **38,89 %**	25 **31,25 %**	31 **40,79 %**	14 **28,57 %**	10 **26,32 %**	9 **22,50 %**	285 **28,00 %**
davon später als 72 Stunden nach Geburt	18 **60,00 %**	71 **78,02 %**	144 **78,26 %**	117 **75,00 %**	112 **75,68 %**	77 **61,11 %**	55 **68,75 %**	45 **59,21 %**	35 **71,43 %**	28 **73,68 %**	31 **77,50 %**	733 **72,00 %**
Keine Pneumonie	101 **97,12 %**	294 **94,84 %**	523 **94,75 %**	541 **95,08 %**	662 **96,64 %**	744 **98,41 %**	905 **99,56 %**	842 **98,94 %**	922 **99,46 %**	710 **99,58 %**	1.222 **99,43 %**	7.466 **98,17 %**
Pneumonie	≤3 **x %**	16 **5,16 %**	29 **5,25 %**	28 **4,92 %**	23 **3,36 %**	12 **1,59 %**	4 **0,44 %**	9 **1,06 %**	5 **0,54 %**	≤3 **x %**	7 **0,57 %**	139 **1,83 %**

[37] Berücksichtigt werden Kinder mit endgültig (postnatal) bestimmtem Gestationsalter (vollendete Wochen) ≥ 22 SSW, die nicht im Kreißsaal verstorben sind oder bei denen dazu keine Angabe gemacht wurde. Mehrfachnennung möglich

Nekrotisierende Enterokolitis (NEK) nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)[38]

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

	22 SSW	23 SSW	24 SSW	25 SSW	26 SSW	27 SSW	28 SSW	29 SSW	30 SSW	31 SSW	≥ 32 SSW	Gesamt
Bund (gesamt)												
Gesamt	104 **100,00 %**	310 **100,00 %**	552 **100,00 %**	569 **100,00 %**	685 **100,00 %**	756 **100,00 %**	909 **100,00 %**	851 **100,00 %**	927 **100,00 %**	713 **100,00 %**	1.229 **100,00 %**	7.605 **100,00 %**
Keine Nekrotisierende Enterokolitis (NEK) (Stadium II oder III)	99 **95,19 %**	287 **92,58 %**	505 **91,49 %**	532 **93,50 %**	648 **94,60 %**	723 **95,63 %**	885 **97,36 %**	841 **98,82 %**	915 **98,71 %**	709 **99,44 %**	1.223 **99,51 %**	7.367 **96,87 %**
Nekrotisierende Enterokolitis (NEK) (Stadium II oder III)	5 **4,81 %**	23 **7,42 %**	47 **8,51 %**	37 **6,50 %**	37 **5,40 %**	33 **4,37 %**	24 **2,64 %**	10 **1,18 %**	12 **1,29 %**	4 **0,56 %**	6 **0,49 %**	238 **3,13 %**

[38] Berücksichtigt werden Kinder mit endgültig (postnatal) bestimmtem Gestationsalter (vollendete Wochen) ≥ 22 SSW, die nicht im Kreißsaal verstorben sind oder bei denen dazu keine Angabe gemacht wurde.

© IQTIG 2026

Fokale intestinale Perforation (FIP) / singuläre intestinale Perforation (SIP) nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)[39]

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

	22 SSW	23 SSW	24 SSW	25 SSW	26 SSW	27 SSW	28 SSW	29 SSW	30 SSW	31 SSW	32 SSW	Gesamt
Bund (gesamt)												
Gesamt	104 **100,00 %**	310 **100,00 %**	552 **100,00 %**	569 **100,00 %**	685 **100,00 %**	756 **100,00 %**	909 **100,00 %**	851 **100,00 %**	927 **100,00 %**	713 **100,00 %**	539 **100,00 %**	7.605 **100,00 %**
Keine fokale intestinale Perforation (FIP) / keine singuläre intestinale Perforation (SIP)	91 **87,50 %**	274 **88,39 %**	500 **90,58 %**	531 **93,32 %**	670 **97,81 %**	734 **97,09 %**	902 **99,23 %**	842 **98,94 %**	920 **99,24 %**	711 **99,72 %**	538 **99,81 %**	7.402 **97,33 %**
Fokale intestinale Perforation (FIP) / singuläre intestinale Perforation (SIP)	13 **12,50 %**	36 **11,61 %**	52 **9,42 %**	38 **6,68 %**	15 **2,19 %**	22 **2,91 %**	7 **0,77 %**	9 **1,06 %**	7 **0,76 %**	≤3 **x %**	≤3 **x %**	203 **2,67 %**
davon erstmalig aufgetreten während des stationären Aufenthaltes	12 **92,31 %**	35 **97,22 %**	45 **86,54 %**	31 **81,58 %**	15 **100,00 %**	17 **77,27 %**	7 **100,00 %**	7 **77,78 %**	7 **100,00 %**	≤3 **x %**	0 **0,00 %**	178 **87,68 %**
davon bereits bei Aufnahme vorliegend	≤3 **x %**	≤3 **x %**	7 **13,46 %**	7 **18,42 %**	0 **0,00 %**	5 **22,73 %**	0 **0,00 %**	≤3 **x %**	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	≤3 **x %**	25 **12,32 %**

[39] Berücksichtigt werden Kinder mit endgültig (postnatal) bestimmtem Gestationsalter (vollendete Wochen) ≥ 22 SSW, die nicht im Kreißsaal verstorben sind oder bei denen dazu keine Angabe gemacht wurde.

Schädelsonogramm nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)[40]

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

	22 SSW	23 SSW	24 SSW	25 SSW	26 SSW	27 SSW	28 SSW	29 SSW	30 SSW	31 SSW	≥ 32 SSW	Gesamt
Bund (gesamt)												
Gesamt	104 **100,00 %**	310 **100,00 %**	552 **100,00 %**	569 **100,00 %**	685 **100,00 %**	756 **100,00 %**	909 **100,00 %**	851 **100,00 %**	927 **100,00 %**	713 **100,00 %**	1.229 **100,00 %**	7.605 **100,00 %**
Kinder mit Verweildauer > 2 Tage	79 **75,96 %**	275 **88,71 %**	529 **95,83 %**	549 **96,49 %**	669 **97,66 %**	733 **96,96 %**	897 **98,68 %**	837 **98,35 %**	920 **99,24 %**	706 **99,02 %**	1.213 **98,70 %**	7.407 **97,40 %**
davon Schädelsonogramm durchgeführt	76 **96,20 %**	270 **98,18 %**	520 **98,30 %**	542 **98,72 %**	652 **97,46 %**	724 **98,77 %**	887 **98,89 %**	828 **98,92 %**	904 **98,26 %**	702 **99,43 %**	1.195 **98,52 %**	7.300 **98,56 %**
davon keine IVH[44]	40 **52,63 %**	150 **55,56 %**	336 **64,62 %**	395 **72,88 %**	511 **78,37 %**	595 **82,18 %**	757 **85,34 %**	759 **91,67 %**	850 **94,03 %**	673 **95,87 %**	1.155 **96,65 %**	6.221 **85,22 %**
davon IVH Grad I	8 **10,53 %**	23 **8,52 %**	43 **8,27 %**	34 **6,27 %**	47 **7,21 %**	68 **9,39 %**	69 **7,78 %**	34 **4,11 %**	33 **3,65 %**	21 **2,99 %**	28 **2,34 %**	408 **5,59 %**
davon IVH Grad II	5 **6,58 %**	27 **10,00 %**	49 **9,42 %**	46 **8,49 %**	27 **4,14 %**	29 **4,01 %**	27 **3,04 %**	16 **1,93 %**	9 **1,00 %**	4 **0,57 %**	4 **0,33 %**	243 **3,33 %**
davon IVH Grad III	9 **11,84 %**	53 **19,63 %**	55 **10,58 %**	36 **6,64 %**	37 **5,67 %**	17 **2,35 %**	22 **2,48 %**	9 **1,09 %**	6 **0,66 %**	≤3 **x %**	4 **0,33 %**	250 **3,42 %**
davon PVH[45]	14 **18,42 %**	17 **6,30 %**	37 **7,12 %**	31 **5,72 %**	30 **4,60 %**	15 **2,07 %**	12 **1,35 %**	10 **1,21 %**	6 **0,66 %**	≤3 **x %**	4 **0,33 %**	178 **2,44 %**

Schädelsonogramm nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)[40]

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

	22 SSW	23 SSW	24 SSW	25 SSW	26 SSW	27 SSW	28 SSW	29 SSW	30 SSW	31 SSW	≥ 32 SSW	Gesamt
davon PVL[46]	≤3 **x %**	12 **4,44 %**	19 **3,65 %**	20 **3,69 %**	19 **2,91 %**	10 **1,38 %**	15 **1,69 %**	14 **1,69 %**	12 **1,33 %**	4 **0,57 %**	6 **0,50 %**	133 **1,82 %**

[40] Berücksichtigt werden Kinder mit endgültig (postnatal) bestimmtem Gestationsalter (vollendete Wochen) ≥ 22 SSW, die nicht im Kreißsaal verstorben sind oder bei denen dazu keine Angabe gemacht wurde. Mehrfachnennung möglich

[44] IVH: Intraventrikuläre Hämorrhagie

[45] PVH: Periventrikuläre Hämorrhagie

[46] PVL: Zystische periventrikuläre Leukomalazie

ROP-Screening nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)

ROP-Screening[47]

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

	22 SSW	23 SSW	24 SSW	25 SSW	26 SSW	27 SSW	28 SSW	29 SSW	30 SSW	31 SSW	≥ 32 SSW	Gesamt
Bund (gesamt)												
Gesamt	104 **100,00 %**	310 **100,00 %**	552 **100,00 %**	569 **100,00 %**	685 **100,00 %**	756 **100,00 %**	909 **100,00 %**	851 **100,00 %**	927 **100,00 %**	713 **100,00 %**	1.229 **100,00 %**	7.605 **100,00 %**
Kinder stationär versorgt innerhalb der ersten 6 Wochen[49]	49 **47,12 %**	214 **69,03 %**	423 **76,63 %**	479 **84,18 %**	607 **88,61 %**	657 **86,90 %**	814 **89,55 %**	724 **85,08 %**	612 **66,02 %**	290 **40,67 %**	216 **17,58 %**	5.085 **66,86 %**
davon ROP-Screening durchgeführt	46 **93,88 %**	192 **89,72 %**	398 **94,09 %**	460 **96,03 %**	575 **94,73 %**	638 **97,11 %**	757 **93,00 %**	680 **93,92 %**	541 **88,40 %**	167 **57,59 %**	90 **41,67 %**	4.544 **89,36 %**

[47] Berücksichtigt werden Kinder mit endgültig (postnatal) bestimmtem Gestationsalter (vollendete Wochen) ≥ 22 SSW, die nicht im Kreißsaal verstorben sind oder bei denen dazu keine Angabe gemacht wurde.

[49] stationär versorgt bis bzw. über den 42. Lebenstag hinaus

Frühgeborenen-Retinopathie (ROP)[50]

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

	22 SSW	23 SSW	24 SSW	25 SSW	26 SSW	27 SSW	28 SSW	29 SSW	30 SSW	31 SSW	≥ 32 SSW	Gesamt
Bund (gesamt)												
Gesamt	104 **100,00 %**	310 **100,00 %**	552 **100,00 %**	569 **100,00 %**	685 **100,00 %**	756 **100,00 %**	909 **100,00 %**	851 **100,00 %**	927 **100,00 %**	713 **100,00 %**	1.229 **100,00 %**	7.605 **100,00 %**
ROP-Screening durchgeführt	46 **44,23 %**	192 **61,94 %**	398 **72,10 %**	460 **80,84 %**	578 **84,38 %**	645 **85,32 %**	771 **84,82 %**	717 **84,25 %**	695 **74,97 %**	250 **35,06 %**	165 **13,43 %**	4.917 **64,65 %**
davon keine ROP	6 **13,04 %**	32 **16,67 %**	117 **29,40 %**	196 **42,61 %**	330 **57,09 %**	446 **69,15 %**	612 **79,38 %**	605 **84,38 %**	615 **88,49 %**	234 **93,60 %**	152 **92,12 %**	3.345 **68,03 %**
davon ROP Stadium 1	≤3 **x %**	33 **17,19 %**	68 **17,09 %**	88 **19,13 %**	115 **19,90 %**	123 **19,07 %**	90 **11,67 %**	79 **11,02 %**	61 **8,78 %**	12 **4,80 %**	8 **4,85 %**	680 **13,83 %**
davon ROP Stadium 2	20 **43,48 %**	51 **26,56 %**	97 **24,37 %**	91 **19,78 %**	93 **16,09 %**	55 **8,53 %**	60 **7,78 %**	28 **3,91 %**	16 **2,30 %**	≤3 **x %**	4 **2,42 %**	518 **10,53 %**
davon ROP Stadium 3	16 **34,78 %**	75 **39,06 %**	115 **28,89 %**	85 **18,48 %**	40 **6,92 %**	21 **3,26 %**	9 **1,17 %**	5 **0,70 %**	≤3 **x %**	≤3 **x %**	≤3 **x %**	371 **7,55 %**
davon ROP Stadium 4	≤3 **x %**	0 **0,00 %**	≤3 **x %**	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	≤3 **x %**
davon ROP Stadium 5	0 **0,00 %**	≤3 **x %**	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	≤3 **x %**

[50] Berücksichtigt werden Kinder mit endgültig (postnatal) bestimmtem Gestationsalter (vollendete Wochen) ≥ 22 SSW, die nicht im Kreißsaal verstorben sind oder bei denen dazu keine Angabe gemacht wurde.

Hörscreening nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)[51]

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

	22 SSW	23 SSW	24 SSW	25 SSW	26 SSW	27 SSW	28 SSW	29 SSW	30 SSW	31 SSW	≥ 32 SSW	Gesamt
Bund (gesamt)												
Gesamt	104 **100,00 %**	310 **100,00 %**	552 **100,00 %**	569 **100,00 %**	685 **100,00 %**	756 **100,00 %**	909 **100,00 %**	851 **100,00 %**	927 **100,00 %**	713 **100,00 %**	1.229 **100,00 %**	7.605 **100,00 %**
davon Hörscreening im aktuellen Aufenthalt durchgeführt	35 **33,65 %**	174 **56,13 %**	346 **62,68 %**	410 **72,06 %**	553 **80,73 %**	622 **82,28 %**	797 **87,68 %**	763 **89,66 %**	847 **91,37 %**	657 **92,15 %**	1.115 **90,72 %**	6.319 **83,09 %**
davon Hörscreening in einem vorherigen Aufenthalt durchgeführt	≤3 **x %**	7 **2,26 %**	21 **3,80 %**	19 **3,34 %**	22 **3,21 %**	25 **3,31 %**	30 **3,30 %**	21 **2,47 %**	22 **2,37 %**	15 **2,10 %**	32 **2,60 %**	217 **2,85 %**
nach Hause entlassene Kinder	30 **28,85 %**	142 **45,81 %**	308 **55,80 %**	389 **68,37 %**	523 **76,35 %**	592 **78,31 %**	758 **83,39 %**	742 **87,19 %**	825 **89,00 %**	639 **89,62 %**	1.105 **89,91 %**	6.053 **79,59 %**
davon Hörscreening im aktuellen Aufenthalt durchgeführt	28 **93,33 %**	140 **98,59 %**	297 **96,43 %**	370 **95,12 %**	508 **97,13 %**	578 **97,64 %**	729 **96,17 %**	723 **97,44 %**	807 **97,82 %**	624 **97,65 %**	1.065 **96,38 %**	5.869 **96,96 %**
davon Hörscreening in einem vorherigen Aufenthalt durchgeführt	≤3 **x %**	≤3 **x %**	5 **1,62 %**	10 **2,57 %**	11 **2,10 %**	13 **2,20 %**	23 **3,03 %**	17 **2,29 %**	17 **2,06 %**	10 **1,56 %**	25 **2,26 %**	134 **2,21 %**

[51] Berücksichtigt werden Kinder mit endgültig (postnatal) bestimmtem Gestationsalter (vollendete Wochen) ≥ 22 SSW, die nicht im Kreißsaal verstorben sind oder bei denen dazu keine Angabe gemacht wurde.

Entlassung

In den nachfolgenden Auswertungen werden ausschließlich lebend geborene Kinder mit Geburtsgewicht < 1.500 g berücksichtigt

Entlassung nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

	< 22 SSW	22 SSW	23 SSW	24 SSW	25 SSW	26 SSW	27 SSW	28 SSW	29 SSW	30 SSW	31 SSW	≥ 32 SSW
Bund (gesamt)												
Gesamt	219 **100,00 %**	201 **100,00 %**	349 **100,00 %**	557 **100,00 %**	577 **100,00 %**	688 **100,00 %**	757 **100,00 %**	913 **100,00 %**	853 **100,00 %**	930 **100,00 %**	718 **100,00 %**	1.242 **100,00 %**
nach Hause entlassen	≤3 **x %**	30 **14,93 %**	142 **40,69 %**	308 **55,30 %**	389 **67,42 %**	523 **76,02 %**	592 **78,20 %**	758 **83,02 %**	742 **86,99 %**	825 **88,71 %**	639 **89,00 %**	1.105 **88,97 %**
davon mit Sauerstoffbedarf bei Entlassung	0 **0,00 %**	6 **20,00 %**	25 **17,61 %**	34 **11,04 %**	29 **7,46 %**	21 **4,02 %**	16 **2,70 %**	16 **2,11 %**	8 **1,08 %**	7 **0,85 %**	5 **0,78 %**	4 **0,36 %**
verlegt in andere Klinik/Abteilung	0 **0,00 %**	21 **10,45 %**	70 **20,06 %**	131 **23,52 %**	104 **18,02 %**	104 **15,12 %**	114 **15,06 %**	117 **12,81 %**	80 **9,38 %**	76 **8,17 %**	59 **8,22 %**	92 **7,41 %**
davon mit Sauerstoffbedarf bei Verlegung	0 **-**	10 **47,62 %**	40 **57,14 %**	85 **64,89 %**	57 **54,81 %**	42 **40,38 %**	48 **42,11 %**	23 **19,66 %**	22 **27,50 %**	12 **15,79 %**	9 **15,25 %**	6 **6,52 %**
verstorben	218 **99,54 %**	150 **74,63 %**	130 **37,25 %**	114 **20,47 %**	78 **13,52 %**	58 **8,43 %**	44 **5,81 %**	32 **3,50 %**	25 **2,93 %**	26 **2,80 %**	13 **1,81 %**	34 **2,74 %**

Entlassung nach Geburtsgewicht

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

	< 500 g	500 - 749 g	750 - 999 g	1000 - 1249 g	1250 - 1499 g	Gesamt
Bund (gesamt)						
Gesamt	703 **100,00 %**	1.382 **100,00 %**	1.692 **100,00 %**	1.878 **100,00 %**	2.349 **100,00 %**	8.004 **100,00 %**
nach Hause entlassen	181 **25,75 %**	832 **60,20 %**	1.334 **78,84 %**	1.604 **85,41 %**	2.103 **89,53 %**	6.054 **75,64 %**
davon mit Sauerstoffbedarf bei Entlassung	40 **22,10 %**	73 **8,77 %**	28 **2,10 %**	18 **1,12 %**	12 **0,57 %**	171 **2,82 %**
verlegt in andere Klinik/Abteilung	89 **12,66 %**	262 **18,96 %**	246 **14,54 %**	198 **10,54 %**	173 **7,36 %**	968 **12,09 %**
davon mit Sauerstoffbedarf bei Verlegung	64 **71,91 %**	130 **49,62 %**	93 **37,80 %**	46 **23,23 %**	21 **12,14 %**	354 **36,57 %**
verstorben	428 **60,88 %**	273 **19,75 %**	106 **6,26 %**	59 **3,14 %**	56 **2,38 %**	922 **11,52 %**

Mortalität und Lebenstage nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen)

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

	< 22 SSW	22 SSW	23 SSW	24 SSW	25 SSW	26 SSW	27 SSW	28 SSW	29 SSW	30 SSW	31 SSW	≥ 32 SSW
Bund (gesamt)												
Gesamt	219 **100,00 %**	201 **100,00 %**	349 **100,00 %**	557 **100,00 %**	577 **100,00 %**	688 **100,00 %**	757 **100,00 %**	913 **100,00 %**	853 **100,00 %**	930 **100,00 %**	718 **100,00 %**	1.242 **100,00 %**
verstorben	218 **99,54 %**	150 **74,63 %**	130 **37,25 %**	114 **20,47 %**	78 **13,52 %**	58 **8,43 %**	44 **5,81 %**	32 **3,50 %**	25 **2,93 %**	26 **2,80 %**	13 **1,81 %**	34 **2,74 %**
davon bis 7. Lebenstag	215 **98,62 %**	134 **89,33 %**	98 **75,38 %**	62 **54,39 %**	41 **52,56 %**	32 **55,17 %**	31 **70,45 %**	19 **59,38 %**	20 **80,00 %**	16 **61,54 %**	8 **61,54 %**	26 **76,47 %**
davon 8. - 28. Lebenstag	≤3 **x %**	13 **8,67 %**	21 **16,15 %**	34 **29,82 %**	23 **29,49 %**	12 **20,69 %**	8 **18,18 %**	8 **25,00 %**	4 **16,00 %**	6 **23,08 %**	≤3 **x %**	6 **17,65 %**
davon nach 28. Lebenstag	≤3 **x %**	≤3 **x %**	11 **8,46 %**	18 **15,79 %**	14 **17,95 %**	14 **24,14 %**	5 **11,36 %**	5 **15,63 %**	≤3 **x %**	4 **15,38 %**	≤3 **x %**	≤3 **x %**

Mortalität und Lebenstage nach Geburtsgewicht

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

	< 500 g	500 - 749 g	750 - 999 g	1000 - 1249 g	1250 - 1499 g	Gesamt
Bund (gesamt)						
Gesamt	703 **100,00 %**	1.382 **100,00 %**	1.692 **100,00 %**	1.878 **100,00 %**	2.349 **100,00 %**	8.004 **100,00 %**
verstorben	428 **60,88 %**	273 **19,75 %**	106 **6,26 %**	59 **3,14 %**	56 **2,38 %**	922 **11,52 %**
davon bis 7. Lebenstag	363 **84,81 %**	187 **68,50 %**	64 **60,38 %**	43 **72,88 %**	45 **80,36 %**	702 **76,14 %**
davon 8. - 28. Lebenstag	45 **10,51 %**	50 **18,32 %**	24 **22,64 %**	13 **22,03 %**	7 **12,50 %**	139 **15,08 %**
davon nach 28. Lebenstag	20 **4,67 %**	36 **13,19 %**	18 **16,98 %**	≤3 **x %**	4 **7,14 %**	81 **8,79 %**

© IQTIG 2026

Mortalität nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen) - Primäraufnahmen[52]

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

	< 22 SSW	22 SSW	23 SSW	24 SSW	25 SSW	26 SSW	27 SSW	28 SSW	29 SSW	30 SSW	31 SSW	≥ 32 SSW
Bund (gesamt)												
Gesamt	218 **100,00 %**	198 **100,00 %**	348 **100,00 %**	557 **100,00 %**	576 **100,00 %**	688 **100,00 %**	757 **100,00 %**	912 **100,00 %**	852 **100,00 %**	928 **100,00 %**	718 **100,00 %**	1.240 **100,00 %**
Primäraufnahmen	218 **100,00 %**	184 **92,93 %**	309 **88,79 %**	481 **86,36 %**	513 **89,06 %**	610 **88,66 %**	683 **90,22 %**	838 **91,89 %**	808 **94,84 %**	881 **94,94 %**	681 **94,85 %**	1.182 **95,32 %**
davon verstorben	217 **99,54 %**	149 **80,98 %**	125 **40,45 %**	111 **23,08 %**	73 **14,23 %**	55 **9,02 %**	40 **5,86 %**	30 **3,58 %**	22 **2,72 %**	23 **2,61 %**	13 **1,91 %**	32 **2,71 %**
davon weiterverlegt	0 **0,00 %**	14 **7,61 %**	54 **17,48 %**	88 **18,30 %**	76 **14,81 %**	69 **11,31 %**	84 **12,30 %**	102 **12,17 %**	72 **8,91 %**	68 **7,72 %**	52 **7,64 %**	79 **6,68 %**
davon nicht weiterverlegt	218 **100,00 %**	170 **92,39 %**	255 **82,52 %**	393 **81,70 %**	437 **85,19 %**	541 **88,69 %**	599 **87,70 %**	736 **87,83 %**	736 **91,09 %**	813 **92,28 %**	629 **92,36 %**	1.103 **93,32 %**
davon verstorben	217 **99,54 %**	149 **87,65 %**	125 **49,02 %**	111 **28,24 %**	73 **16,70 %**	55 **10,17 %**	40 **6,68 %**	30 **4,08 %**	22 **2,99 %**	23 **2,83 %**	13 **2,07 %**	32 **2,90 %**
davon bis 7. Lebenstag	214 **98,62 %**	133 **89,26 %**	98 **78,40 %**	61 **54,95 %**	41 **56,16 %**	32 **58,18 %**	30 **75,00 %**	19 **63,33 %**	18 **81,82 %**	15 **65,22 %**	8 **61,54 %**	26 **81,25 %**
davon 8. - 28. Lebenstag	≤3 **x %**	13 **8,72 %**	20 **16,00 %**	34 **30,63 %**	21 **28,77 %**	12 **21,82 %**	6 **15,00 %**	7 **23,33 %**	4 **18,18 %**	5 **21,74 %**	≤3 **x %**	4 **12,50 %**

Mortalität nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen) - Primäraufnahmen[52]

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

	< 22 SSW	22 SSW	23 SSW	24 SSW	25 SSW	26 SSW	27 SSW	28 SSW	29 SSW	30 SSW	31 SSW	≥ 32 SSW
davon nach 28. Lebenstag	≤3 **x %**	≤3 **x %**	7 **5,60 %**	16 **14,41 %**	11 **15,07 %**	11 **20,00 %**	4 **10,00 %**	4 **13,33 %**	0 **0,00 %**	≤3 **x %**	≤3 **x %**	≤3 **x %**

[52] unter Ausschluss von Kindern mit Aufnahmestatus "sonstiges"

Mortalität nach Geburtsgewicht - Primäraufnahmen[53]

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

	< 500 g	500 - 749 g	750 - 999 g	1000 - 1249 g	1250 - 1499 g	Gesamt
Bund (gesamt)						
Gesamt	701 **100,00 %**	1.378 **100,00 %**	1.691 **100,00 %**	1.877 **100,00 %**	2.345 **100,00 %**	7.992 **100,00 %**
Primäraufnahmen	648 **92,44 %**	1.217 **88,32 %**	1.540 **91,07 %**	1.751 **93,29 %**	2.232 **95,18 %**	7.388 **92,44 %**
davon verstorben	421 **64,97 %**	262 **21,53 %**	101 **6,56 %**	53 **3,03 %**	53 **2,37 %**	890 **12,05 %**
davon weiterverlegt	63 **9,72 %**	184 **15,12 %**	186 **12,08 %**	173 **9,88 %**	152 **6,81 %**	758 **10,26 %**
davon nicht weiterverlegt	585 **90,28 %**	1.033 **84,88 %**	1.354 **87,92 %**	1.578 **90,12 %**	2.080 **93,19 %**	6.630 **89,74 %**
davon verstorben	421 **71,97 %**	262 **25,36 %**	101 **7,46 %**	53 **3,36 %**	53 **2,55 %**	890 **13,42 %**
davon bis 7. Lebenstag	361 **85,75 %**	186 **70,99 %**	64 **63,37 %**	40 **75,47 %**	44 **83,02 %**	695 **78,09 %**
davon 8. - 28. Lebenstag	44 **10,45 %**	47 **17,94 %**	23 **22,77 %**	11 **20,75 %**	5 **9,43 %**	130 **14,61 %**

© IQTIG 2026

Mortalität nach Geburtsgewicht - Primäraufnahmen[53]

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

	< 500 g	500 - 749 g	750 - 999 g	1000 - 1249 g	1250 - 1499 g	Gesamt
davon nach 28. Lebenstag	16 **3,80 %**	29 **11,07 %**	14 **13,86 %**	≤3 **x %**	4 **7,55 %**	65 **7,30 %**

[53] unter Ausschluss von Kindern mit Aufnahmestatus "sonstiges"

Mortalität nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen) - Sekundäraufnahmen[54]

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

	< 22 SSW	22 SSW	23 SSW	24 SSW	25 SSW	26 SSW	27 SSW	28 SSW	29 SSW	30 SSW	31 SSW	≥ 32 SSW
Bund (gesamt)												
Gesamt	218 **100,00 %**	198 **100,00 %**	348 **100,00 %**	557 **100,00 %**	576 **100,00 %**	688 **100,00 %**	757 **100,00 %**	912 **100,00 %**	852 **100,00 %**	928 **100,00 %**	718 **100,00 %**	1.240 **100,00 %**
Sekundäraufnahmen	0 **0,00 %**	14 **7,07 %**	39 **11,21 %**	76 **13,64 %**	63 **10,94 %**	78 **11,34 %**	74 **9,78 %**	74 **8,11 %**	44 **5,16 %**	47 **5,06 %**	37 **5,15 %**	58 **4,68 %**
davon verstorben	0 **-**	0 **0,00 %**	5 **12,82 %**	≤3 **x %**	5 **7,94 %**	≤3 **x %**	4 **5,41 %**	≤3 **x %**	≤3 **x %**	≤3 **x %**	0 **0,00 %**	≤3 **x %**
davon weiterverlegt	0 **-**	6 **42,86 %**	16 **41,03 %**	43 **56,58 %**	27 **42,86 %**	35 **44,87 %**	30 **40,54 %**	15 **20,27 %**	8 **18,18 %**	7 **14,89 %**	7 **18,92 %**	13 **22,41 %**
davon nicht weiterverlegt	0 **-**	8 **57,14 %**	23 **58,97 %**	33 **43,42 %**	36 **57,14 %**	43 **55,13 %**	44 **59,46 %**	59 **79,73 %**	36 **81,82 %**	40 **85,11 %**	30 **81,08 %**	45 **77,59 %**
davon verstorben	0 **-**	0 **0,00 %**	5 **21,74 %**	≤3 **x %**	5 **13,89 %**	≤3 **x %**	4 **9,09 %**	≤3 **x %**	≤3 **x %**	≤3 **x %**	0 **0,00 %**	≤3 **x %**
davon bis 7. Lebenstag	0 **-**	0 **-**	0 **0,00 %**	≤3 **x %**	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	≤3 **x %**	0 **0,00 %**	≤3 **x %**	≤3 **x %**	0 **-**	0 **0,00 %**
davon 8. - 28. Lebenstag	0 **-**	0 **-**	≤3 **x %**	0 **0,00 %**	≤3 **x %**	0 **0,00 %**	≤3 **x %**	≤3 **x %**	0 **0,00 %**	≤3 **x %**	0 **-**	≤3 **x %**

Mortalität nach Gestationsalter (in vollendeten Wochen) - Sekundäraufnahmen[54]

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

	< 22 SSW	22 SSW	23 SSW	24 SSW	25 SSW	26 SSW	27 SSW	28 SSW	29 SSW	30 SSW	31 SSW	≥ 32 SSW
davon nach 28.	0	0	4	≤3	≤3	≤3	≤3	≤3	≤3	≤3	0	0
Lebenstag	-	-	**80,00 %**	**x %**	**x %**	**x %**	**x %**	**x %**	**x %**	**x %**	-	**0,00 %**

[54] unter Ausschluss von Kindern mit Aufnahmestatus "sonstiges"

Mortalität nach Geburtsgewicht - Sekundäraufnahmen[55]

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

	< 500 g	500 - 749 g	750 - 999 g	1000 - 1249 g	1250 - 1499 g	Gesamt
Bund (gesamt)						
Gesamt	701 **100,00 %**	1.378 **100,00 %**	1.691 **100,00 %**	1.877 **100,00 %**	2.345 **100,00 %**	7.992 **100,00 %**
Sekundäraufnahmen	53 **7,56 %**	161 **11,68 %**	151 **8,93 %**	126 **6,71 %**	113 **4,82 %**	604 **7,56 %**
davon verstorben	6 **11,32 %**	10 **6,21 %**	5 **3,31 %**	6 **4,76 %**	≤3 **x %**	30 **4,97 %**
davon weiterverlegt	25 **47,17 %**	77 **47,83 %**	60 **39,74 %**	25 **19,84 %**	20 **17,70 %**	207 **34,27 %**
davon nicht weiterverlegt	28 **52,83 %**	84 **52,17 %**	91 **60,26 %**	101 **80,16 %**	93 **82,30 %**	397 **65,73 %**
davon verstorben	6 **21,43 %**	10 **11,90 %**	5 **5,49 %**	6 **5,94 %**	≤3 **x %**	30 **7,56 %**
davon bis 7. Lebenstag	≤3 **x %**	0 **0,00 %**	0 **0,00 %**	≤3 **x %**	≤3 **x %**	5 **16,67 %**
davon 8. - 28. Lebenstag	≤3 **x %**	≤3 **x %**	≤3 **x %**	≤3 **x %**	≤3 **x %**	9 **30,00 %**

Mortalität nach Geburtsgewicht - Sekundäraufnahmen[55]

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Spaltenkollektiv.

	< 500 g	500 - 749 g	750 - 999 g	1000 - 1249 g	1250 - 1499 g	Gesamt
davon nach 28. Lebenstag	4 **66,67 %**	7 **70,00 %**	4 **80,00 %**	≤3 **x %**	0 **0,00 %**	16 **53,33 %**

[55] unter Ausschluss von Kindern mit Aufnahmestatus "sonstiges"

© IQTIG 2026